

Ασκήσεις
ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ I - Επανάληψη

Υπενθυμίσεις

1. Έστω V, W διανυσματικοί χώροι επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) = m$, $\dim_{\mathbb{F}}(W) = n < \infty$ και έστω $f : V \rightarrow W$ γραμμική. Θεωρούμε $\hat{a} := (a_1, a_2, \dots, a_m)$ και $\hat{b} := (b_1, b_2, \dots, b_n)$ διατεταγμένες βάσεις των V και W αντίστοιχα. Έστω $(f : \hat{a}, \hat{b}) := A$ ο πίνακας αναπαράστασης της f ως προς τις βάσεις αυτές. Τότε,

$$[f(x)]_{\hat{b}} = A[x]_{\hat{a}}, \quad \forall x \in V.$$

2. Έστω V, W, U διανυσματικοί χώροι επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V), \dim_{\mathbb{F}}(W), \dim_{\mathbb{F}}(U) < \infty$. Θεωρούμε $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ διατεταγμένες βάσεις των V, W, U αντίστοιχα. Έστω $f : V \rightarrow W$ και $g : W \rightarrow U$ γραμμικές απεικονίσεις. Τότε,

$$(g \circ f : \hat{a}, \hat{c}) = (g : \hat{b}, \hat{c}) \cdot (f : \hat{a}, \hat{b}).$$

3. Έστω V, W διανυσματικοί χώροι επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V), \dim_{\mathbb{F}}(W) < \infty$. Θεωρούμε $\hat{a}, \hat{b}$ διατεταγμένες βάσεις των V, W αντίστοιχα. Έστω $f : V \rightarrow W$ γραμμική. Τότε,

$$f \text{ ισομορφισμός} \Leftrightarrow (f : \hat{a}, \hat{b}) \text{ αντιστρέψιμος.}$$

4. Έστω $A, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. Λέμε ότι ο A είναι ισοδύναμος με το B αν υπάρχουν αντιστρέψιμοι πίνακες $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $Q \in \mathbb{F}^{m \times m}$ τέτοιοι ώστε $B = PAQ$ και συμβολίζουμε $A \sim B$.

Άσκηση 1 Έστω $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ αντιστρέψιμοι. Τότε, ο πίνακας AB είναι επίσης αντιστρέψιμος.

Λύση Έστω $\hat{a}$ μια διατεταγμένη βάση του $\mathbb{F}^n \cong \mathbb{F}^{n \times 1}$. Θεωρούμε τις (γραμμικές) απεικονίσεις

$$\gamma_A : \mathbb{F}^{n \times 1} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times 1} \quad \text{με} \quad \mathbb{F}^{n \times 1} \ni X \mapsto \gamma_A(X) := AX \in \mathbb{F}^{n \times 1},$$

$$\gamma_B : \mathbb{F}^{n \times 1} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times 1} \quad \text{με} \quad \mathbb{F}^{n \times 1} \ni X \mapsto \gamma_B(X) := BX \in \mathbb{F}^{n \times 1}$$

και

$$\gamma_{AB} : \mathbb{F}^{n \times 1} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times 1} \quad \text{με} \quad \mathbb{F}^{n \times 1} \ni X \mapsto \gamma_{AB}(X) := ABX \in \mathbb{F}^{n \times 1}.$$

Οι απεικονίσεις αυτές είναι γραμμικοί ισομορφισμοί. Έχουμε ότι

$$(\gamma_A : \hat{a}, \hat{a}) = A, \quad (\gamma_B : \hat{a}, \hat{a}) = B \quad \text{και} \quad (\gamma_{AB} : \hat{a}, \hat{a}) = AB.$$

Έτσι, $\gamma_{AB} = \gamma_A \circ \gamma_B$ = σύνθεση ισομορφισμών άρα ισομορφισμός $\Rightarrow AB$ αντιστρέψιμος.

Άσκηση 2 Δείξτε ότι η ισοδυναμία πινάκων αποτελεί μια σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο $\mathbb{F}^{n \times m}$.

Λύση

1. Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times m}$. Τότε $A \sim A$. Πράγματι, $A = I_{n \times n} A I_{m \times m}$.
2. Έστω $A, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$ με $A \sim B$. Τότε $B \sim A$. Πράγματι, αφού $A \sim B$, υπάρχουν $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $Q \in \mathbb{F}^{m \times m}$ αντιστρέψιμοι τέτοιοι ώστε $B = PAQ$. Τότε,

$$P^{-1}PAQ = P^{-1}B \Rightarrow AQ = P^{-1}B \Rightarrow AQQ^{-1} = P^{-1}BQ^{-1} \Rightarrow A = P^{-1}BQ^{-1}.$$

3. Έστω $A, B, C \in \mathbb{F}^{n \times m}$ με $A \sim B$ και $B \sim C$. Τότε $A \sim C$. Πράγματι, αφού $A \sim B$, υπάρχουν $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $Q \in \mathbb{F}^{m \times m}$ αντιστρέψιμοι τέτοιοι ώστε $B = PAQ$ και αφού $B \sim C$, υπάρχουν $R \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $Z \in \mathbb{F}^{m \times m}$ αντιστρέψιμοι τέτοιοι ώστε $C = RBZ$. Τότε, από την προηγούμενη Άσκηση, αφού οι πίνακες R, P είναι αντιστρέψιμοι, θα είναι και ο πίνακας RP αντιστρέψιμος και αφού οι πίνακες Q, Z είναι αντιστρέψιμοι, θα είναι και ο πίνακας QZ αντιστρέψιμος. Έτσι,

$$C = R(PAQ)Z = (RP)A(QZ)$$

με τους RP και QZ αντιστρέψιμους, άρα $A \sim C$.

Άσκηση 3 Έστω $f : V \rightarrow W$ μια γραμμική απεικόνιση όπου V, W διανυσματικοί χώροι επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V), \dim_{\mathbb{F}}(W) < \infty$. Δείξτε ότι

1. $f(0_V) = 0_W$ και $f(v - w) = f(v) - f(w)$, $\forall v, w \in V$.
2. Αν $V' \subset V$, $W' \subset W$ διανυσματικοί υπόχωροι των V και W αντίστοιχα, να δείχθεί ότι τα σύνολα $f(V)$ και $f^{-1}(W')$ είναι διανυσματικοί υπόχωροι των W και V αντίστοιχα.

Λύση

1. Έχουμε

$$f(0_V) = f(0_{\mathbb{F}} \cdot 0_V) = 0_{\mathbb{F}} \cdot f(0_V) = 0_W,$$

από τη γραμμικότητα της f . Επίσης,

$$\begin{aligned} f(v - w) &= f(v + (-w)) = f(v) + f(-w) = f(v) + f((-1)w) \\ &= f(v) - 1_{\mathbb{F}}f(w) = f(v) - f(w). \end{aligned}$$

2. Είναι

$$f(V') = \{w \in W \mid \exists v \in V' : f(v) = w\}.$$

Το σύνολο $f(V')$ είναι μη κενό, αφού το $0_V \in V'$, διότι ο V' είναι διανυσματικός υπόχωρος του $V \Rightarrow f(0_V) = 0_W \in f(V')$. Τώρα, αν $u_1, u_2 \in f(V')$, υπάρχουν $w_1, w_2 \in W$ τέτοια ώστε $f(w_1) = u_1$ και $f(w_2) = u_2$. Συνεπώς, $u_1 + u_2 = f(w_1) + f(w_2) \Rightarrow w_1 + w_2 \in f(V')$. Τέλος, αν $\lambda \in \mathbb{F}$ και $w \in f(V')$, τότε υπάρχει $v \in V'$ με $f(v) = w$. Επομένως, $\lambda w = \lambda f(v) = f(\lambda v)$. Αλλά το $\lambda v \in V'$, αφού ο V' είναι διανυσματικός υπόχωρος του V . Έπεται λοιπόν ότι $f(\lambda v) \in f(V')$. Από γνωστό θεώρημα, έχουμε ότι ο $f(V')$ είναι διανυσματικός υπόχωρος του W . Ομοίως δείχνουμε ότι και ο $f^{-1}(W')$ είναι διανυσματικός υπόχωρος του V .

Άσκηση 4 Έστω $f : V \rightarrow W$ μια γραμμική απεικόνιση όπου V, W διανυσματικοί χώροι επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) = n < \infty$ και $\dim_{\mathbb{F}}(\text{Im} f) = r < \infty$. Δείξτε ότι υπάρχει μια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του V και μια διατεταγμένη βάση $\hat{b}$ του W τέτοιες ώστε

$$(f : \hat{a}, \hat{b}) \equiv \mathcal{M}_{\hat{b}}^{\hat{a}} = \begin{bmatrix} I_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Λύση Επιλέγουμε μια διατεταγμένη βάση του $\ker f : \hat{\gamma} = (a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_n)$ και την επεκτείνουμε σε μια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του V ως εξής

$$\hat{a} = (a_1, \dots, a_r, a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_n).$$

Το σύνολο $\{f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_r)\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο υποσύνολο του W . Το επεκτείνουμε σε μια βάση $\{f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_r), b_{r+1}, b_{r+2}, \dots, b_m\}$ του W . Τότε, η

$$\hat{b} = (f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_r), b_{r+1}, b_{r+2}, \dots, b_m)$$

αποτελεί βάση του W και

$$(f : \hat{a}, \hat{b}) \equiv \mathcal{M}_{\hat{b}}^{\hat{a}} = \begin{bmatrix} I_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Γραμμική Άλγεβρα

Ασκήσεις II - Δακτύλιοι, Ισοτιμίες

Υπενθυμίσεις

Ορισμός 0.0.1 Έστω $m \in \mathbb{Z}$. Δύο ακέραιοι a και b θα λέγονται *ισότιμοι modulo m* (ή *ισοϋπόλοιποι modulo m*) αν ο m διαιρεί τη διαφορά $a - b$. Γράφουμε $a \equiv b \pmod{m}$, δηλ.

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b).$$

Πρόταση 0.0.1 Έστω $m \in \mathbb{Z}_+$ και $a, b \in \mathbb{Z}$. Τότε,

1. Ισχύει $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow$ οι a και b αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο όταν διαιρεθούν με το m .
2. Υπάρχει ακριβώς ένας ακέραιος r με $a \equiv r \pmod{m}$, όπου $0 \leq r < m$.

Πρόταση 0.0.2 Αν $a \equiv b \pmod{m}$ και $c \equiv d \pmod{m}$, τότε

$$(a + c) \equiv (b + d) \pmod{m}, \quad \text{και} \quad ac \equiv bd \pmod{m},$$

δηλ. οι ισοτιμίες συμπεριφέρονται καλώς ως προς την πρόσθεση και πολλαπλασιασμό στους ακεραίους.

Πόρισμα 0.0.1 Αν $a \equiv b \pmod{m}$ και $c \in \mathbb{Z}$, τότε

$$(a + c) \equiv (b + c) \pmod{m}, \quad ac \equiv bc \pmod{m} \quad \text{και} \quad a^n \equiv b^n \pmod{m},$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Πρόταση 0.0.3 1. Αν $ac \equiv bc \pmod{cm}$, όπου $c \neq 0$, τότε $a \equiv b \pmod{m}$.

2. Αν $ac \equiv bc \pmod{m}$, όπου τουλάχιστον ένας από τους c, m είναι $\neq 0$, τότε $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$, όπου $d = \mu\kappa\delta(c, m)$.

Σχέσεις Ισοδυναμίας

Ορισμός 0.0.2 Έστω A ένα μη κενό σύνολο. Μια σχέση στο A είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου $A \times A := \{(a, b) : a, b \in A\}$. Έστω X μια σχέση στο A . Αντί να γράφουμε $(a, b) \in X$, γράφουμε $a \sim b$. Μια σχέση στο A λέγεται *σχέση ισοδυναμίας* (στο A) αν

1. $a \sim a, \forall a \in A$ [Ανακλαστική Ιδιότητα]
2. Αν $a \sim b$, τότε $b \sim a$, για $a, b \in A$ [Συμμετρική Ιδιότητα]
3. Αν $a \sim b$ και $b \sim c$, τότε $a \sim c$, για $a, b, c \in A$ [Μεταβατική Ιδιότητα]

Έστω $A \neq \emptyset$ και X μια σχέση ισοδυναμίας στο A . Αν $a, b \in A$ με $a \sim b$, θα λέμε ότι το a είναι ισοδύναμο με το b . Το σύνολο

$$[a] := \{x \in A : x \sim a\}$$

είναι το σύνολο των ισοδύναμων με το a στοιχείων και θα λέγεται κλάση ισοδυναμίας του a .

Πρόταση 0.0.4 Έστω $A \neq \emptyset$ και X μια σχέση ισοδυναμίας στο A . Έστω $a, b \in A$. Τότε,

1. $[a] = [b] \Leftrightarrow a \sim b$.
2. $[a] \cap [b] = \emptyset \Leftrightarrow a \not\sim b$.
3. Το σύνολο A μπορεί να παρασταθεί ως ένωση ξένων κλάσεων ισοδυναμίας, δηλ.

$$A = \bigcup_{a \in A} [a],$$

όπου $[a] \cap [a'] = \emptyset$, για κάθε $a, a' \in A$ με $a \neq a'$.

Το σύνολο των ακεραίων modulo m Έστω $m \in \mathbb{N}$. Στο σύνολο $\mathbb{Z}$ θεωρούμε τη σχέση $\sim$ που ορίζεται ως εξής:

$$a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$

Η πιο πάνω σχέση είναι μια σχέση ισοδυναμίας:

1. $a \equiv a \pmod{m}$, για κάθε $a \in \mathbb{Z}$, αφού $m/(a - a)$, για κάθε $a \in \mathbb{Z}$.
2. Αν $a \equiv b \pmod{m}$, τότε $b \equiv a \pmod{m}$, αφού $m/(a - b) \Rightarrow m/[-(a - b)]$, δηλ. $m/(b - a)$.
3. Αν $a \equiv b \pmod{m}$ και $b \equiv c \pmod{m}$, τότε $a \equiv c \pmod{m}$, αφού $m/(a - b)$ και $m/(b - c) \Rightarrow m/[(a - b) + (b - c)]$, δηλ. $m/(a - c)$.

Για να δηλώσουμε την εξάρτηση της σχέσης αυτής από το φυσικό αριθμό m , γράφουμε $a \sim_m b$. Θα δούμε τώρα τη μορφή των στοιχείων του συνόλου $[a]$, για $a \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} [a] &= \{z \in \mathbb{Z} : z \equiv a \pmod{m}\} \\ &= \{z \in \mathbb{Z} : m/(z - a)\} \\ &= \{z \in \mathbb{Z} : z - a = km \text{ για κάποιο } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Επομένως, τα στοιχεία της κλάσης $[a]$ είναι της μορφής

$$a + km, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Γράφουμε $[a] = a + m\mathbb{Z}$, για να δηλώσουμε αυτό. Από την Προηγούμενη Πρόταση, έχουμε ότι

$$[a] = [b] \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$

Το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας που ορίζονται με τη σχέση αυτή συμβολίζεται με $\mathbb{Z}_m$, δηλ.

$$\mathbb{Z}_m := \{[a] : a \in \mathbb{Z}\}.$$

Παραδείγματα 0.0.1

1. $m = 2$.

Έχουμε

$$[0] = \{2k : k \in \mathbb{Z}\},$$

δηλ. το $[0]$ αποτελείται από όλους τους άρτιους αριθμούς. Επίσης,

$$[1] = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\},$$

δηλ. το $[1]$ αποτελείται από όλους τους περιττούς αριθμούς. Αλλά, οι άρτιοι αριθμοί είναι ισότιμοι modulo m , δηλ.

$$\dots [-6] = [-4] = [-2] = [0] = [2] = [4] = [6] = \dots$$

και οι περιττοί αριθμοί επίσης ισότιμοι modulo m , δηλ.

$$\dots [-5] = [-3] = [-1] = [1] = [3] = [5] = \dots,$$

άρα, $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\} = \{[-4], [-3]\} = \{[-4], [1]\}$ κ.ο.κ.. Γενικά,

$$\mathbb{Z}_2 = \{[a_0], [a_1]\}, \quad \text{όπου } a_0 \equiv 0 \pmod{2}, \quad a_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

2. $m = 3$.

Έχουμε

$$[0] = \{3k : k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3, 0, 3, \dots\}$$

$$[1] = \{3k + 1 : k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -2, 1, 4, \dots\}$$

$$[2] = \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -1, 2, 5, \dots\}.$$

Αλλά,

$$\dots = [-3] = [0] = [3] = \dots$$

$$\dots = [-2] = [1] = [4] = \dots$$

$$\dots = [-1] = [2] = [5] = \dots$$

Επομένως, $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\} = \{[-3], [-2], [-1]\} = \{[-3], [1], [2]\}$ κ.ο.κ.. Γενικά,

$$\mathbb{Z}_3 = \{[a_0], [a_1], [a_2]\}, \quad \text{όπου } a_0 \equiv 0 \pmod{3}, \quad a_1 \equiv 1 \pmod{3}, \quad a_2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Γενικότερα, έχουμε

Πρόταση 0.0.5 Για κάθε $m \in \mathbb{Z}_+$ έχουμε ότι

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}.$$

Γενικότερα,

$$\mathbb{Z}_m = \{[a_0], [a_1], \dots, [a_{m-1}]\},$$

όπου $a_i \in \mathbb{Z}$ τέτοιοι ώστε $a_i \equiv i \pmod{m}$, $i \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Οι κλάσεις ισοδυναμίας $[a_i]$, $i \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ είναι διακεκριμένες: Αν $[a_i] = [a_j]$ για $i, j \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, τότε έχουμε ότι $i \equiv j \pmod{m}$, οπότε από Πρόταση έχουμε ότι $i = j$. Κάθε κλάση ισοδυναμίας $[a]$ ανήκει στο σύνολο $\{[a_0], [a_1], \dots, [a_{m-1}]\}$: Πράγματι από τον αλγόριθμο διαιρέσης, έχουμε ότι $a = qm + r$, όπου $0 \leq r \leq m-1$. Επομένως, $a \equiv r \pmod{m}$ και άρα $[a] = [r] = [a_r]$. Δείξαμε λοιπόν ότι $\mathbb{Z}_m \subseteq \{[a_0], [a_1], \dots, [a_{m-1}]\}$. Συνεπώς, $\mathbb{Z}_m = \{[a_0], [a_1], \dots, [a_{m-1}]\}$. ■

Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός στο $\mathbb{Z}_m$

$$\begin{aligned} + & : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{με} \quad (a, b) \mapsto a + b \\ \cdot & : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{με} \quad (a, b) \mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Ομοίως,

$$\begin{aligned} + & : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m \quad \text{με} \quad ([a], [b]) \mapsto [a + b] \\ \cdot & : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m \quad \text{με} \quad ([a], [b]) \mapsto [a \cdot b]. \end{aligned}$$

Αποδεικνύεται εύκολα ότι οι πιο πάνω αντιστοιχίες είναι πράγματι απεικονίσεις.

Αντιστροφή στοιχείων στο $\mathbb{Z}_m$ Θέλουμε να επιλύσουμε την εξίσωση $[a][x] = [b]$ στο $\mathbb{Z}_m$. Ένα στοιχείο $[a] \in \mathbb{Z}_m$ λέγεται αντιστρέψιμο αν υπάρχει $[b] \in \mathbb{Z}_m$ τέτοιο ώστε $[a][b] = [1]$, δηλ. αν υπάρχει ακέραιος b τέτοιος ώστε $ab \equiv 1 \pmod{m}$. Για παράδειγμα, στο $\mathbb{Z}_6$ το $[5]$ είναι αντιστρέψιμο αφού $[5][5] = [1]$.

Άσκηση 1 1. Έστω $[a]$ ένα αντιστρέψιμο στοιχείο του $\mathbb{Z}_m$. Δείξτε ότι υπάρχει μοναδικό στοιχείο $[b] \in \mathbb{Z}_m$ τέτοιο ώστε $[a][b] = [1]$, δηλ. ότι έχει μοναδικό αντίστροφο.

2. Το στοιχείο $[a] \in \mathbb{Z}_m$ είναι αντιστρέψιμο αν και μόνο αν $\mu\kappa\delta(a, m) = 1$.

Λύση

1. Έστω $[a]$ ένα αντιστρέψιμο στοιχείο του $\mathbb{Z}_m$. Έστω $[b] \in \mathbb{Z}_m$ ένα αντίστροφό του, δηλ. $[a][b] = [1]$. Θα δείξουμε ότι είναι μοναδικό. Αν λοιπόν υπήρχε ένα άλλο αντίστροφο στοιχείο του $[a]$ έστω $[c] \in \mathbb{Z}_m$, δηλ. τέτοιο ώστε $[a][c] = [1]$, θα είχαμε ότι

$$[b] = [b][1] = [b]([a][c]) = ([b][a])[c] = ([b][a])[c] = [1][c] = [c].$$

2. ($\Rightarrow$) Έστω $[b] \in \mathbb{Z}_m$ το αντίστροφο στοιχείο του $[a]$, δηλ. $[a][b] = [1]$. Τότε $ab \equiv 1 \pmod{m}$, δηλ. $ab = mn + 1$, για κάποιο $n \in \mathbb{Z}$. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι $\mu\kappa\delta(m, n) = 1$.

($\Leftarrow$) Έστω ότι $\mu\kappa\delta(m, n) = 1$. Τότε, υπάρχουν $x, y \in \mathbb{Z}$ τέτοια ώστε $ax + my = 1$, από Θεώρημα. Τότε,

$$\begin{aligned} [ax + my] = [1] & \Rightarrow [ax] + [my] = [1] \\ & \Rightarrow [a][x] + [m][y] = [1] \\ & \Rightarrow [a][x] + [0][y] = [1] \\ & \Rightarrow [a][x] = [1], \end{aligned}$$

δηλ. το στοιχείο $[a]$ είναι αντιστρέψιμο.

Ορισμός 0.0.3 Ένα σύνολο A εφοδιασμένο με δύο πράξεις $+, \cdot : A \times A \rightarrow A$ ονομάζεται **δακτύλιος** αν ισχύουν τα εξής:

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$, $\forall a, b, c \in A$.

2. Υπάρχει στοιχείο $0_A \in A$ τέτοιο ώστε $a + 0_A = 0_A + a, \forall a \in A$.
3. Για κάθε $a \in A$ υπάρχει στοιχείο $a' \in A$ τέτοιο ώστε $a + a' = a' + a = 0_A$.
4. $a + b = b + a, \forall a, b \in A$.
5. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in A$.
6. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in A$.
7. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \forall a, b, c \in A$.

Το 0_A λέγεται το μηδενικό στοιχείο του δακτυλίου και το a' το αντίθετο του $a \equiv -a$. Και τα δύο είναι μοναδικά. Αν στο δακτύλιο A ισχύει $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in A$, τότε ο A θα λέγεται μεταθετικός. Αν στο δακτύλιο A υπάρχει στοιχείο 1_A με την ιδιότητα $1_A \cdot a = a \cdot 1_A$ για κάθε $a \in A$, το 1_A θα λέγεται το μοναδιαίο στοιχείο του δακτυλίου A . Σε ένα δακτύλιο A είναι δυνατόν να υπάρχουν μη μηδενικά στοιχεία a, b με την ιδιότητα $ab = 0$ (π.χ. $[2][3] = [6] = [0]$ στο $\mathbb{Z}_6$). Στην περίπτωση αυτή το a λέγεται αριστερός μηδενοδιαιρέτης του A και το b δεξιός μηδενοδιαιρέτης του A . Αν ο δακτύλιος είναι μεταθετικός, τότε οι δύο αυτοί μηδενοδιαιρέτες ταυτίζονται.

Ορισμός 0.0.4 Ένας μεταθετικός δακτύλιος A με μοναδιαίο στοιχείο $1_A \neq 0_A$ ονομάζεται *ακεραία περιοχή* αν δεν έχει μηδενοδιαιρέτες.

Ένα στοιχείο a ενός δακτυλίου A με μοναδιαίο στοιχείο 1_A λέγεται *αντιστρέψιμο* στο A αν υπάρχει $r \in A$ τέτοιο ώστε $ar = ra = 1_A$.

Ορισμός 0.0.5 Ένας μεταθετικός δακτύλιος A με μοναδιαίο στοιχείο $1_A \neq 0_A$ στο οποίο κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο λέγεται *σώμα*.

Παραδείγματα 0.0.2 1. Το $\mathbb{Z}_n$ είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο. $0_{\mathbb{Z}_n} = [0]$ και $-[a] = [-a]$. Επίσης, $1_{\mathbb{Z}_n} = [1]$.

2. Οι δακτύλιοι $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ είναι ακεραίες περιοχές.
3. Οι δακτύλιοι $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ είναι σώματα, όχι όμως το $\mathbb{Z}$.

Πρόταση 0.0.6 Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}_n$ είναι ακεραία περιοχή αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος ή μηδέν.

Πρόταση 0.0.7 Κάθε πεπερασμένη ακεραία περιοχή είναι σώμα.

Πόρισμα 0.0.2 Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}_n$ είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος.

Ορισμός 0.0.6 Ένα σύνολο G λέμε ότι έχει τη δομή ομάδας ή απλά ότι είναι μια ομάδα ως προς μια πράξη $f : G \times G \rightarrow G$ για την οποία γράφουμε $f(x, y) = x \circ y$, για κάθε $x, y \in G$ αν ικανοποιούνται οι εξής ιδιότητες:

1. Υπάρχει ένα στοιχείο $e \in G$ τέτοιο ώστε για κάθε $x \in G$ να ισχύει $x \circ e = e \circ x = x$.
2. Για κάθε $x \in G$, υπάρχει ένα $y \in G$ τέτοιο ώστε $x \circ y = y \circ x = e$, όπου e ένα στοιχείο της G όπως στο προηγούμενο.
3. Για κάθε $x, y, z \in G$, ισχύει $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$, δηλ. ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα.

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ III - Πολυώνυμα

Διαίρεση πολυωνύμων:

$$p(x) = q(x)h(x) + r(x) \quad \text{όπου } \deg(r(x)) < \deg(h(x)).$$

Άσκηση 1 Έστω R μια ακεραία περιοχή. Τότε

1. Ο $R[x]$ είναι ακεραία περιοχή.

2. Αν $\phi(x), \theta(x) \in R[x]$ μη μηδενικά, τότε

$$(a') \deg(\phi(x)\theta(x)) = \deg(\phi(x)) + \deg(\theta(x)).$$

Ισχύει η πιο πάνω σχέση αν R είναι τυχαίος μεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο.

(β') Είτε $\phi(x) + \theta(x) = 0$ είτε $\deg(\phi(x) + \theta(x)) \leq \max\{\deg(\phi(x)), \deg(\theta(x))\}$. Πότε ισχύει γνήσια η ανισότητα;

ΛΥΣΗ

1. Επειδή ο R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο, έχουμε ότι ο $R[x]$ είναι μεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο. Επίσης, $1_{R[x]} = 1_R \neq 0_R = 0_{R[x]}$. Ο $R[x]$ δεν έχει μηδενοδιαίρετες:

Έστωσαν $f(x), g(x) \in R[x]$ μη μηδενικά. Τότε,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

και

$$g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i.$$

με $a_n, b_m \neq 0$. Έχουμε

$$f(x)g(x) = (a_0b_0) + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \dots + (a_nb_m)x^{n+m} = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_ib_j \right) x^k. \quad (1)$$

Επειδή ο R δεν έχει μηδενοδιαίρετες, ισχύει ότι $a_nb_m \neq 0$, και άρα $f(x)g(x) \neq 0$.

2. (α) Αν $\phi(x), \theta(x) \in R[x]$ μη μηδενικά, τότε από την (1) έπεται ότι

$$\deg(\phi(x)\theta(x)) = \deg(\phi(x)) + \deg(\theta(x)).$$

Για τυχαίο δακτύλιο R με μοναδιαίο στοιχείο ισχύει για $f(x), g(x) \in R[x]$:

$$\deg(f(x)g(x)) \leq \deg(f(x)) + \deg(g(x)).$$

Αυτό διότι αν ο $R[x]$ έχει μηδενοδιαίρετες, είναι δυνατόν να ισχύει γνήσια η πιο πάνω ανισότητα. Για παράδειγμα, $f(x) = [2]x + [1]$ και $g(x) = [3]x + [1]$ στο $\mathbb{Z}_6[x]$. Τότε, $f(x)g(x) = [6]x^2 + [5]x + [4] = [0]x^2 + [5]x + 4 = [5]x + [4]$ το οποίο έχει βαθμό 1.

(β')

Άσκηση 2 Έστω $\phi \in \mathbb{F}_n[x]$. Δείξτε ότι υπάρχει $\theta \in \mathbb{F}_n[x]$ τέτοιο ώστε $\phi \cdot \theta = 1 \Leftrightarrow$ το ϕ (άρα και το θ) είναι σταθερό μη μηδενικό πολυώνυμο.

ΛΥΣΗ ($\Rightarrow$) Έχουμε $\phi(x)\theta(x) = 1 \Leftrightarrow \deg(\phi(x)\theta(x)) = \deg(1) \Leftrightarrow \deg(\phi(x)) + \deg(\theta(x)) = 0 \Leftrightarrow \deg(\phi(x)) = \deg(\theta(x)) = 0$ (διότι $\deg(\phi(x)), \deg(\theta(x)) \geq 0$) $\Leftrightarrow \phi(x)$ (και άρα και το $\theta(x)$) είναι σταθερό μη μηδενικό πολυώνυμο.

($\Leftarrow$) Αν $\phi(x) = c \neq 0$, τότε για $\theta(x) := c^{-1}$ έχουμε $\phi(x)\theta(x) = 1$.

Άσκηση 3 Έστω $\phi, \theta \in \mathbb{F}_n[x]$. Δείξτε ότι $\phi \cdot \theta = 0 \Leftrightarrow$ τουλάχιστον ένα από τα ϕ και θ είναι το μηδενικό πολυώνυμο.

ΛΥΣΗ ($\Rightarrow$) Έστω ότι $\phi(x)\theta(x) = 0$. Αν $\phi, \theta \neq 0$, τότε $\deg(\phi(x)), \deg(\theta(x)) \geq 0$, επομένως

$$\deg(\phi(x) \cdot \theta(x)) = \deg(\phi(x)) + \deg(\theta(x)) \geq 0.$$

Άρα, $\phi(x) \cdot \theta(x) \neq 0$, άτοπο. Συνεπώς, ένα τουλάχιστον από τα ϕ και θ είναι μη μηδενικό.

($\Leftarrow$) Αν ένα τουλάχιστον από τα ϕ και θ είναι μηδενικό, τότε (προφανώς) $\phi(x)\theta(x) = 0$.

Άσκηση 4 Δείξτε ότι δεν υπάρχει πολυώνυμο $\phi \in \mathbb{R}_n[x]$ τέτοιο ώστε

$$(\phi(x))^{12} = (x+1)^{23} + (x-4)^{2013}.$$

ΛΥΣΗ $\deg(\phi(x)) = n \Rightarrow \deg[(\phi(x))^{12}] = 12n$. Επίσης, $\deg[(x+1)^{23} + (x-4)^{2013}] = 2013$. Για να υπήρχε τέτοιο πολυώνυμο, θα έπρεπε $12n = 2013$, το οποίο δεν μπορεί να γίνει, αφού $n = \frac{2013}{12} \notin \mathbb{N}$.]

Άσκηση 5 Κάντε τις ακόλουθες διαφάνειες πολυωνύμων $p(x)/q(x)$ αν

1. $p(x) = x^4, \quad q(x) = x - 1.$
2. $p(x) = x^3 - 12x^2 - 42, \quad q(x) = x - 3.$
3. $p(x) = x^3 + x^2 - 1, \quad q(x) = x - 1.$

Λύση

1.

$$\begin{array}{r}
 x-1 \overline{) \begin{array}{r} x^3 + x^2 + x + 1 \\ x^4 \\ \hline -x^4 + x^3 \\ \hline x^3 \\ -x^3 + x^2 \\ \hline x^2 \\ -x^2 + x \\ \hline x \\ -x + 1 \\ \hline 1 \end{array}}
 \end{array}$$

Άρα,

$$\frac{x^4}{x-1} = x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1}$$

ή

$$x^4 = (x^3 + x^2 + x + 1)(x - 1) + 1.$$

2.

$$\begin{array}{r} x^2 - 9x - 27 \\ x - 3 \overline{) \begin{array}{r} x^3 - 12x^2 - 42 \\ - x^3 + 3x^2 \\ \hline - 9x^2 - 27x - 42 \\ 9x^2 - 27x \\ \hline - 27x - 42 \\ 27x - 81 \\ \hline - 123 \end{array}} \end{array}$$

Άρα,

$$\frac{x^3 - 12x^2 - 42}{x - 3} = x^2 - 9x - 27 - \frac{123}{x - 3}$$

ή

$$x^3 - 12x^2 - 42 = (x^2 - 9x - 27)(x - 3) - 123.$$

3.

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 2 \\ x - 1 \overline{) \begin{array}{r} x^3 + x^2 - 1 \\ - x^3 + x^2 \\ \hline 2x^2 - 2x^2 + 2x \\ - 2x^2 + 2x \\ \hline 2x - 1 \\ - 2x + 2 \\ \hline 1 \end{array}} \end{array}$$

Άρα,

$$\frac{x^3 + x^2 - 1}{x - 1} = x^2 + 2x + 2 + \frac{1}{x - 1}$$

ή

$$x^3 + x^2 - 1 = (x^2 + 2x + 2)(x - 1) + 1.$$

Γραμμική Άλγεβρα II

ΑΣΚΗΣΕΙΣ IV - Ιδιότητες, Ιδιοδιανύσματα, Χαρακτηριστικό πολυώνυμο

Συμβολισμοί: $\mathcal{L}(V, V) \equiv \text{End}(V) = \{f : V \rightarrow V \mid f \text{ γραμμική}\}$

Άσκηση 1 Έστω V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης επί του σώματος $F = \mathbb{R}$ ή $\mathbb{C}$. Έστω $\hat{a}$ μια διατεταγμένη βάση του V και $f \in \mathcal{L}(V, V)$. Αν $p \in \mathbb{F}_n[x]$, τότε ο πίνακας της γραμμικής απεικόνισης $p(f)$ ως προς την $\hat{a}$ είναι ο $p(A)$, όπου $A = (f : \hat{a}, \hat{a})$, δηλ. $(p(f) : \hat{a}, \hat{a}) = p(A)$.

Άσκηση 2 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $f(x, y, z) := (x + y, y + z, x + z)$. Θεωρούμε το πολυώνυμο $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 2$. Να υπολογιστεί ο πίνακας της $p(f)$ ως προς την κανονική βάση $\hat{e} := \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ του $\mathbb{R}^3$ και ακολούθως ως προς τη βάση $\hat{a} := \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$.

Άσκηση 3 Έστω V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης επί του σώματος $F = \mathbb{R}$ ή $\mathbb{C}$. Έστω $f \in \mathcal{L}(V, V)$ και $p \in \mathbb{F}_n[x]$. Αν λ είναι μια ιδιοτιμή της f , δείξτε ότι και το $p(\lambda)$ είναι μια ιδιοτιμή της $p(f)$.

Άσκηση 4 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $f(x, y) = (x + 2y, 3x + 2y)$. Βρείτε τον πίνακα της f ως προς την κανονική βάση του $\mathbb{R}^2$. Ακολούθως, βρείτε τις ιδιοτιμές της f .

Άσκηση 5 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $f(x, y, z) = (4x, 2y - 5z, y - 2z)$. Βρείτε τον πίνακα της f ως προς την κανονική βάση του $\mathbb{R}^3$. Ακολούθως, βρείτε τις ιδιοτιμές της f .

Άσκηση 6

Βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο και τις ιδιοτιμές του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 7 Έστω $a \neq 0$ αριθμός. Δείξτε ότι τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ παράγουν ένα μονοδιάστατο χώρο. Βρείτε μια βάση του χώρου αυτού.

Άσκηση 8 Βρείτε τις ιδιοτιμές και μια βάση για τους ιδιόχωρους του πίνακα $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Άσκηση 9 Βρείτε τις ιδιοτιμές και μια βάση για καθέναν από τους ιδιόχωρους του πίνακα

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Άσκηση 10 Έστω $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ γραμμική, δηλ. $f \in \text{End}(\mathbb{R}^4)$. Έστω

$$A := (f : \hat{a}, \hat{a}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ο πίνακας αναπαράστασης της f ως προς κάποια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του $\mathbb{R}^4$. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και οι ιδιοχώροι της f .

Άσκηση 11 Έστω V διανυσματικός χώρος επί του σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f : V \rightarrow V$ ισομορφισμός. Δείξτε ότι

1. Η f^{-1} είναι γραμμική.
2. Αν το $\lambda \in \mathbb{F}$ είναι ιδιοτιμή της f , τότε $\lambda \neq 0$.
3. $\lambda \in \mathbb{F}$ ιδιοτιμή της $f \Leftrightarrow$ το λ^{-1} είναι ιδιοτιμή της f^{-1} .
4. Για κάθε $\lambda \in V \setminus \{0\}$, είναι $V_f(\lambda) = V_{f^{-1}}(\lambda^{-1})$.
5. f διαγωνίσιμη $\Leftrightarrow f^{-1}$ διαγωνίσιμη.

Άσκηση 1 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ αντιστρέψιμος. Αν λ , δείξτε ότι $\lambda \neq 0$ και ότι το λ^{-1} είναι ιδιοτιμή του A^{-1} .

Άσκηση 12 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ πεπερασμένης διάστασης. Έστω $f \in \text{End}(V)$ τέτοια ώστε $f \circ f = f$.

(i) Δείξτε ότι $V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f$.

(ii) Βρείτε τις ιδιοτιμές και τους αντίστοιχους ιδιοχώρους της f .

Άσκηση 13 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ πεπερασμένης διάστασης. Έστω $f, g \in \text{End}(V)$ τέτοιες ώστε $f \circ g = g \circ f$ και η f έχει ν διακεκριμένες ιδιοτιμές, όπου $\nu = \dim_{\mathbb{F}} V$. Δείξτε ότι η g είναι διαγωνίσιμη.

Άσκηση 14 Θεωρούμε το σύστημα

$$\begin{cases} x'_1(t) &= 2x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x'_2(t) &= -x_1 + 3x_2 - x_3 \\ x'_3(t) &= -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 \end{cases}$$

με αρχική συνθήκη $(x_1(0), x_2(0), x_3(0)) = (1, 0, 0)$ όπου οι $x_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$ είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Να προσδιορίσετε όλες τις μη τετριμμένες λύσεις του συστήματος.

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ IV - Ιδιότητες, Ιδιοδιανύσματα, Χαρακτηριστικό πολυώνυμο

Συμβολισμοί: $\mathcal{L}(V, V) \equiv \text{End}(V) = \{f : V \rightarrow V \mid f \text{ γραμμική}\}$

Άσκηση 1 Έστω V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης επί του σώματος $F = \mathbb{R}$ ή $\mathbb{C}$. Έστω $\hat{a}$ μια διατεταγμένη βάση του V και $f \in \mathcal{L}(V, V)$. Αν $p \in \mathbb{F}_n[x]$, τότε ο πίνακας της γραμμικής απεικόνισης $p(f)$ ως προς την $\hat{a}$ είναι ο $p(A)$, όπου $A = (f : \hat{a}, \hat{a})$, δηλ. $(p(f) : \hat{a}, \hat{a}) = p(A)$.

Λύση Ισχύουν: αν $f, g \in \mathcal{L}(V, V)$, και $\hat{a}$ μια διατεταγμένη βάση του V , τότε

$$(f + g : \hat{a}, \hat{a}) = (f : \hat{a}, \hat{a}) + (g : \hat{a}, \hat{a}),$$

$$(f \circ g : \hat{a}, \hat{a}) = (f : \hat{a}, \hat{a})(g : \hat{a}, \hat{a})$$

και (αν $\lambda \in \mathbb{F}$), τότε

$$(\lambda f : \hat{a}, \hat{a}) = \lambda(f : \hat{a}, \hat{a}).$$

Έστω ότι $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Τότε, $p(f) = a_n f^n + \dots + a_1 f + a_0 1_V$. Τότε, έχουμε

$$\begin{aligned} (p(f) : \hat{a}, \hat{a}) &= (a_n f^n : \hat{a}, \hat{a}) + \dots + (a_1 f : \hat{a}, \hat{a}) + (a_0 1_V : \hat{a}, \hat{a}) \\ &= a_n (f^n : \hat{a}, \hat{a}) + \dots + a_1 (f : \hat{a}, \hat{a}) + a_0 (1_V : \hat{a}, \hat{a}) \\ &= a_n (f : \hat{a}, \hat{a})^n + \dots + a_1 (f : \hat{a}, \hat{a}) + a_0 (1_V : \hat{a}, \hat{a}) \\ &= a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I_{m \times m} \\ &= p(A), \end{aligned}$$

όπου $m = \dim(V)$.

Άσκηση 2 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $f(x, y, z) := (x + y, y + z, x + z)$. Θεωρούμε το πολυώνυμο $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 2$. Να υπολογιστεί ο πίνακας της $p(f)$ ως προς την κανονική βάση $\hat{e} := \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ του $\mathbb{R}^3$ και ακολουθώντας ως προς τη βάση $\hat{a} := \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$.

ΛΥΣΗ Έχουμε ότι

$$A := \mathcal{M}_{\hat{e}}^{\hat{e}}(f) \equiv (f : \hat{e}, \hat{e}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Από την προηγούμενη Άσκηση, είναι

$$(p(f) : \hat{e}, \hat{e}) \equiv \mathcal{M}_{\hat{e}}^{\hat{e}}(p(f)) = p(A) = A^3 - 2A^2 + 3A - 2I_{2 \times 2}.$$

Τώρα, θα προσδιορίσουμε τον πίνακα της $p(f)$ ως προς τη βάση $\hat{a}$ μέσω της σχέσης

$$(p(f) : \hat{a}, \hat{a}) = (id : \hat{e}, \hat{a}) \cdot (p(f) : \hat{e}, \hat{e}) \cdot (id : \hat{a}, \hat{e}).$$

Βρίσκουμε ότι

$$(p(f) : \hat{a}, \hat{a}) \equiv \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 3 Έστω V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης επί του σώματος $F = \mathbb{R}$ ή $\mathbb{C}$. Έστω $f \in \mathcal{L}(V, V)$ και $p \in \mathbb{F}_n[x]$. Αν λ είναι μια ιδιοτιμή της f , δείξτε ότι και το $p(\lambda)$ είναι μια ιδιοτιμή της $p(f)$.

Λύση Έστω λ ιδιοτιμή που αντιστοιχεί στο ιδιοδιάνυσμα v , δηλ. $f(v) = \lambda v$. Άρα, $f^2(v) = f(f(v)) = \lambda(f(v)) = \lambda^2 v$ και γενικά $f^k(v) = \lambda^k v$ για κάθε $k = 1, \dots, n$. Επομένως, αν $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ τότε $(p(f))(v) = (a_n f^n + \dots + a_1 f + a_0 1_V)(v) = (a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0)v = p(\lambda)v$ το οποίο σημαίνει ότι το $p(\lambda)$ είναι μια ιδιοτιμή του $p(f)$.

Άσκηση 4 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $f(x, y) = (x + 2y, 3x + 2y)$. Βρείτε τον πίνακα της f ως προς την κανονική βάση του $\mathbb{R}^2$. Ακολουθώντας, βρείτε τις ιδιοτιμές της f .

Λύση $\hat{a} = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Τότε

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Έχουμε

$$|A - tI_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} 1-t & 2 \\ 3 & 2-t \end{vmatrix} = -t^2 - 3 - t - 4 = (t+1)(t-4).$$

Άρα, οι ιδιοτιμές της f ως προς τον A είναι οι $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$.

Άσκηση 5 Έστω η γραμμική απεικόνιση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $f(x, y, z) = (4x, 2y - 5z, y - 2z)$. Βρείτε τον πίνακα της f ως προς την κανονική βάση του $\mathbb{R}^3$. Ακολουθώντας, βρείτε τις ιδιοτιμές της f .

Λύση $\hat{a} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. Τότε

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Έχουμε

$$|A - tI_{3 \times 3}| = \begin{vmatrix} 4-t & 0 & 0 \\ 0 & 2-t & -5 \\ 0 & 1 & t-2-t \end{vmatrix} = (4-t)[-(2-t)(2+t)+5] = (4-t)(t^2+1) = -(t-4)(t^2+1).$$

Άρα, η f ως προς τον A έχει μόνο μια ιδιοτιμή, την $\lambda_1 = 4$ αν το σώμα $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Αν το σώμα είναι το $\mathbb{C}$, τότε, έχει και τις $\lambda_2 = i$, $\lambda_3 = -i$.

Άσκηση 6

Βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο και τις ιδιοτιμές του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

Λύση

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= \begin{vmatrix} t-1 & -3 & -3 \\ -3 & t+5 & -3 \\ -6 & 6 & t-4 \end{vmatrix} = t^3 - 12t - 16 = t^3 - 4t - 8t - 16 \\ &= t(t^2 - 4) - 8t - 16 = (t+2)[(t-2) - 8] = (t+2)^2(t-4). \end{aligned}$$

Άσκηση 7 Έστω $a \neq 0$ αριθμός. Δείξτε ότι τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ παράγουν ένα μονοδιάστατο χώρο. Βρείτε μια βάση του χώρου αυτού.

Λύση Έστω $v_1 = (x, y)$ ένα ιδιοδιάνυσμα του A . Τότε $Av_1 = \lambda v_1$ ή ισοδύναμα

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + ay = \lambda x \\ y = \lambda y \end{cases} \Leftrightarrow \lambda = 1, y = 0.$$

Δηλ. κάθε ιδιοδιάνυσμα είναι της μορφής $(x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$. Συνεπώς, $V = \text{span}\{(1, 0)\}$ και $V = \dim_{\mathbb{R}}(V) = 1$.

Άσκηση 2 Βρείτε τις ιδιοτιμές και μια βάση για τους ιδιόχωρους του πίνακα $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & 4 \\ 2 & t-3 \end{vmatrix} = (t-1)(t-3) - 8 = t^2 - 4t - 5 = (t-5)(t+1).$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα είναι 5 και -1 . Αν (x, y) είναι ένα ιδιοδιάνυσμα τότε

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

το οποίο δίνει τις εξισώσεις $(1-\lambda)x + 4y = 0$ και $2x + (3-\lambda)y = 0$. Θέτουμε $x = 1$ και βρίσκουμε $y = \frac{-2}{3-\lambda}$. Άρα τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα έχουν τη μορφή $\begin{pmatrix} 1 \\ -2/(3-\lambda) \end{pmatrix}$. Αντικαθιστώντας $\lambda = 5$ και $\lambda = -1$ παίρνω $v_1 = (1, 1)$ και $v_2 = (1, -1/2)$. Άρα για την ιδιοτιμή 5 ο ιδιόχωρος (που είναι μονοδιάστατος) έχει βάση το v_1 και για την ιδιοτιμή -1 ο μονοδιάστατος υπόχωρος που παράγεται έχει βάση το v_2 . Παρατηρήστε ότι αν αντικαθιστούσαμε το x με οποιονδήποτε άλλον αριθμό (εκτός του 1) θα παίρναμε αντί των v_1, v_2 κάποια πολλαπλασιάσιά τους. Επομένως δεν θα άλλαζαν ούτε οι ιδιόχωροι ούτε βέβαια η διάστασή τους.

Άσκηση 8 Βρείτε τις ιδιοτιμές και μια βάση για καθέναν από τους ιδιόχωρους του πίνακα

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Λύση

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-3).$$

Άρα, $\lambda_1 = 2$ (διπλή) και το $\lambda_2 = 3$. Αν τώρα (x, y, z) είναι ένα ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $\lambda_1 = 2$ τότε εργαζόμενοι όπως προηγούμενα παίρνουμε το σύστημα

$$\begin{aligned} (2-\lambda)x + y &= 0 \\ (1-\lambda)y - z &= 0 \\ 2y + (4-\lambda)z &= 0 \end{aligned}.$$

Για $\lambda = 2$ παίρνουμε το διάνυσμα $v_1 = (x, 0, 0)$ και άρα ο ιδιόχωρος V_1 που παράγεται είναι μονοδιάστατος και μία βάση του είναι το διάνυσμα $(1, 0, 0)$. Για $\lambda_2 = 3$ το διάνυσμα που παίρνουμε είναι το $v_2 = (x, x, -2z)$. Άρα ο ιδιόχωρος V_2 που παράγεται είναι μονοδιάστατος και μια βάση του είναι το διάνυσμα $(1, 1, -2)$.

Άσκηση 9 Έστω $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ γραμμική, δηλ. $f \in \text{End}(\mathbb{R}^4)$. Έστω

$$A := (f : \hat{a}, \hat{a}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ο πίνακας αναπαράστασης της f ως προς κάποια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του $\mathbb{R}^4$. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και οι ιδιόχωροι της f .

Λύση

$$\begin{aligned} \chi_f(\lambda) &= |A - \lambda I_{4 \times 4}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -\lambda & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\substack{r_3 \rightarrow r_3 - r_2 \\ r_4 \rightarrow r_4 - 2r_2}}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 & -1 \\ 0 & \lambda+1 & -(\lambda+1) & 0 \\ 0 & 2\lambda-1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2\lambda-1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\substack{r_2 \rightarrow r_2 - r_1 \\ r_3 \rightarrow r_3 + r_1 \\ r_4 \rightarrow r_4 + r_1}}{=} (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & 0 \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & -1 \\ 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1-\lambda & 2(\lambda-1) & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)(1-\lambda)(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & 0 \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)(1-\lambda)^2 \begin{vmatrix} \lambda & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)(\lambda+1)(1-\lambda)^2 \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-1)^2. \end{aligned}$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές της f είναι $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ με πολλαπλότητα 2 η κάθε μια. Για τον ιδιόχωρο V_1 που αντιστοιχεί στην $\lambda_1 = 1$ έχουμε

$$\begin{aligned} V_1 &= \ker(f - id_{\mathbb{R}^4}) = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : A_1(x, y, z, w)^T = (0, 0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_4, x_2 = x_3\} \\ &= \langle (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0) \rangle \end{aligned}$$

και για τον ιδιόχωρο V_2 που αντιστοιχεί στην $\lambda_2 = -1$ έχουμε

$$\begin{aligned} V_2 &= \ker(f + id_{\mathbb{R}^4}) = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : A_2(x, y, z, w)^T = (0, 0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x_1 = x_3 = x_2, x_2 + x_3 = x_4 - x_1\} \\ &= \langle (1, 2, 0, 3), (0, 1, 1, 2) \rangle. \end{aligned}$$

Άσκηση 10 Έστω V διανυσματικός χώρος επί του σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f : V \rightarrow V$ ισομορφισμός. Δείξτε ότι

1. Η f^{-1} είναι γραμμική.
2. Αν το $\lambda \in \mathbb{F}$ είναι ιδιοτιμή της f , τότε $\lambda \neq 0$.
3. $\lambda \in \mathbb{F}$ ιδιοτιμή της $f \Leftrightarrow$ το λ^{-1} είναι ιδιοτιμή της f^{-1} .
4. Για κάθε $\lambda \in V \setminus \{0\}$, είναι $V_f(\lambda) = V_{f^{-1}}(\lambda^{-1})$.
5. f διαγωνίσιμη $\Leftrightarrow f^{-1}$ διαγωνίσιμη.

Λύση

1. Η f^{-1} υπάρχει αφού f 1-1 και επί. Έστω $v_1, v_2 \in V$. Θα δείξουμε ότι $f^{-1}(v_1 + v_2) = f^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2)$. Αφού f επί, έχουμε ότι $f^{-1}(v_1) = w_1$ για κάποιο $w_1 \in V$ και $f^{-1}(v_2) = w_2$ για κάποιο $w_2 \in V$. Τότε,

$$v_1 = f(w_1), \quad v_2 = f(w_2). \quad (2)$$

Έτσι, αφού f γραμμική,

$$\begin{aligned} f(w_1 + w_2) &= f(w_1) + f(w_2) \stackrel{(2)}{=} v_1 + v_2 \\ \Rightarrow f^{-1}(f(w_1 + w_2)) &= f^{-1}(v_1 + v_2) \\ \Rightarrow w_1 + w_2 &= f^{-1}(v_1 + v_2), \end{aligned}$$

δηλ.

$$f^{-1}(v_1 + v_2) = f^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2).$$

Ακολούθως θα δείξουμε ότι αν $\lambda \in \mathbb{F}$ και $v \in V$, τότε $f^{-1}(\lambda v) = \lambda f^{-1}(v)$. Πράγματι, αφού $v \in V$ και f επί, θα υπάρχει $w \in V$ τέτοιο ώστε

$$f^{-1}(v) = w, \quad (3)$$

άρα $v = f(w)$. Έτσι,

$$\begin{aligned} f(\lambda w) &= \lambda f(w) = \lambda v \Rightarrow f^{-1}(f(\lambda w)) = f^{-1}(\lambda v) \\ \Rightarrow \lambda w &= f^{-1}(\lambda v) \\ \stackrel{(3)}{\Rightarrow} f^{-1}(\lambda v) &= \lambda f^{-1}(v). \end{aligned}$$

Έπεται λοιπόν ότι η f^{-1} είναι γραμμική.

2. Έστω $\lambda \in \mathbb{F}$ ιδιοτιμή της f . Έστω $v \in V \setminus \{0\}$ ένα ιδιοδιάνυσμα της f που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ , δηλ. $f(v) = \lambda v$. Αν $\lambda = 0$, τότε $f(v) = \lambda v = 0$ και αφού f γραμμική, θα είναι $v = 0$, άτοπο. Άρα, $\lambda \neq 0$.
3. Έστω $\lambda \in \mathbb{F}$ ιδιοτιμή της f . Από το προηγούμενο ερώτημα, $\lambda \neq 0$. Έστω $v \in V \setminus \{0\}$ ένα ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην λ . Τότε,

$$f(v) = \lambda v \Rightarrow (f^{-1} \circ f)(v) = f^{-1}(\lambda v) \Rightarrow v = f^{-1}(\lambda v) \stackrel{f^{-1} \text{ γραμμική}}{=} \lambda f^{-1}(v),$$

δηλ.

$$f^{-1}(v) = \lambda^{-1}v,$$

δηλ. το λ^{-1} είναι ιδιοτιμή της f^{-1} .

4. Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι για κάθε $\lambda \in V \setminus \{0\}$, είναι $V_f(\lambda) = V_{f^{-1}}(\lambda^{-1})$.
5. f διαγωνίσιμη $\Leftrightarrow f^{-1}$ διαγωνίσιμη.

Άσκηση 3 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ αντιστρέψιμος. Αν λ , δείξτε ότι $\lambda \neq 0$ και ότι το λ^{-1} είναι ιδιοτιμή του A^{-1} .

Λύση Το αποτέλεσμα είναι άμεσο από την προηγούμενη άσκηση, αφού αν $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ο πίνακας ενός γραμμικού ισομορφισμού $f : V \rightarrow V$, με $\dim_{\mathbb{F}} V = n$ ως προς κάποια διατεταγμένη βάση του V , τότε ο A^{-1} είναι ο αντίστοιχος πίνακας της f^{-1} . Διαφορετικά, μπορούμε να το αποδείξουμε άμεσα ως εξής: Έστω $x \neq 0$ ένα ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ . Τότε, αφού $x \neq 0$, έπεται ότι $\lambda \neq 0$. Επίσης έχουμε

$$Ax = \lambda x \Leftrightarrow A^{-1}(Ax) = A^{-1}\lambda x \Leftrightarrow x = \lambda(A^{-1}x) \Leftrightarrow A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x,$$

απόπου έπεται το ζητούμενο.

Άσκηση 15 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ πεπερασμένης διάστασης. Έστω $f \in \text{End}(V)$ τέτοια ώστε $f \circ f = f$.

(i) Δείξτε ότι $V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f$.

(ii) Βρείτε τις ιδιοτιμές και τους αντίστοιχους ιδιοχώρους της f .

Λύση

- (i) Για να δείξουμε ότι $V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f$, αρκεί να δείξουμε ότι $V = \text{Ker}f + \text{Im}f$ και $\text{Ker}f \cap \text{Im}f = \{0_V\}$. Για το πρώτο, αφού τα σύνολα $\text{Ker}f$ και $\text{Im}f$ είναι υπόχωροι του V , έπεται ότι $V \supseteq \text{Ker}f + \text{Im}f$. Τώρα, αν $v \in V$, έχουμε ότι $v = (v - f(v)) + f(v)$. Προφανώς, $f(v) \in \text{Im}f$ και $v - f(v) \in \text{Ker}f$. Πράγματι,

$$f(v - f(v)) \stackrel{f \text{ γραμμική}}{=} f(v) - f(f(v)) \stackrel{f \circ f = f}{=} f(v) - f(v) = 0_V.$$

Συνεπώς, $v \in \text{Ker}f + \text{Im}f$ και άρα $V \subseteq \text{Ker}f + \text{Im}f$. Για το $\text{Ker}f \cap \text{Im}f = \{0_V\}$, θεωρούμε $v \in \text{Ker}f \cap \text{Im}f$. Τότε,

$$v \in \text{Ker}f \Rightarrow f(v) = 0_V \tag{4}$$

και

$$v \in \text{Im}f \Rightarrow \exists w \in V : f(w) = v. \tag{5}$$

Τότε,

$$v = f(w) \stackrel{f \circ f = f}{=} f(f(w)) \stackrel{(5)}{=} f(v) \stackrel{(4)}{=} 0_V.$$

Έτσι,

$$V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f,$$

δηλαδή η f είναι η προβολή της $\text{Im}f$ πάνω στον $\text{Ker}f$.

- (ii) Θα προσδιορίσουμε τις ιδιοτιμές της f . Έστω λ ιδιοτιμή της f , δηλ. $f(u) = \lambda u$, για κάποιο $u \in V \setminus \{0_V\}$. Τότε,

$$f(f(u)) = f(\lambda u) \stackrel{f \text{ γραμμική}}{=} \lambda f(u) \Rightarrow (1 - \lambda)f(u) = 0_V,$$

δηλ. είτε $\lambda = 1$ είτε $f(u) = 0_V$. Στη δεύτερη περίπτωση, η ιδιοτιμή είναι η $\lambda = 0$. Για τους αντίστοιχους ιδιοχώρους $V(1)$ και $V(0)$ έχουμε

$$V(0) = \{v \in V \setminus \{0_V\} : f(v) = 0_V = 0\},$$

Δηλ.

$$V(0) = \text{Ker}f.$$

Επίσης,

$$V(1) = \{v \in V \setminus \{0_V\} : f(v) = v\}.$$

Θα δείξουμε ότι $V(1) = \text{Im}f$. Έστω $u \in \text{Im}f$. Τότε $u = f(w)$ για κάποιο $w \in W$. Έχουμε $f(u) = f(f(w)) \stackrel{f \circ f = f}{=} f(w) = u$ και άρα $u \in V(1)$. Έτσι, $V(1) \supseteq \text{Im}f$. Τώρα, αν $u \in V(1)$, τότε $f(u) = u$. Αλλά $u \in V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f$ και άρα $u = w + v$, όπου $v \in \text{Im}f$ και $w \in \text{Ker}f$. Έτσι,

$$u = w + v \Rightarrow f(u) = f(w) + f(v) = f(v),$$

αφού $f(w) = 0_V$, διότι $w \in \text{Ker}f$. Επομένως, $u \in \text{Im}f$ και άρα $V(1) \subseteq \text{Im}f$. Άρα,

$$V(1) = \text{Im}f.$$

Έτσι,

$$V = \text{Ker}f \oplus \text{Im}f = V(0) \oplus V(1).$$

Άρα, αν A μια βάση από ιδιοδιανύσματα του $V(0)$ και B μια βάση από ιδιοδιανύσματα του $V(1)$, μπορούμε εύκολα να βρούμε τον πίνακα της f ως προς τη βάση $A \cup B$.

Άσκηση 16 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ πεπερασμένης διάστασης. Έστω $f, g \in \text{End}(V)$ τέτοιες ώστε $f \circ g = g \circ f$ και η f έχει ν διακεκριμένες ιδιοτιμές, όπου $\nu = \dim_{\mathbb{F}} V$. Δείξτε ότι η g είναι διαγωνίσιμη.

Λύση Έστω λ μια ιδιοτιμή της f και $V_f(\lambda)$ ο αντίστοιχος ιδιοχώρος. Αν $u \in V_f(\lambda) \setminus \text{ker } g$, τότε

$$f(u) = \lambda u \Rightarrow (g \circ f)(u) = g(\lambda u) = \lambda g(u) \stackrel{f \circ g = g \circ f}{=} (f \circ g)(u) = g(f(u)) = g(\lambda u),$$

δηλ. $g(u) \in V_f(\lambda)$. Έτσι, $g(V_f(\lambda)) \subseteq V_f(\lambda)$. Συνεπώς, οι f και g έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές. Αλλά η f έχει ιδιοτιμές, $\nu = \dim_{\mathbb{F}} V$ διακεκριμένες ιδιοτιμές και άρα και η g . Έτσι, από Θεώρημα, η g είναι (επίσης) διαγωνίσιμη.

Άσκηση 17 Έστωσαν

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Δείξτε ότι τα παρακάτω είναι ισοδύναμα:

(1) Οι πίνακες A και B είναι όμοιοι.

(2) $\chi_A = \chi_B$.

(3) Υπάρχει μετάθεση $\sigma \in S_n$ τέτοια ώστε $b_i = a_{\sigma(i)}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Λύση (1) $\Rightarrow$ (2) Από Θεώρημα.

(2) $\Rightarrow$ (3) Έστω ότι $\chi_A = \chi_B$. Αφού οι πίνακες A και B είναι διαγώνιοι, έπεται ότι

$$\chi_A(t) = (a_1 - t) \dots (a_n - t) \quad \text{και} \quad \chi_B(t) = (b_1 - t) \dots (b_n - t).$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές του A είναι ίδιες με τις ιδιοτιμές του B , πιθανώς με μια αναδιάταξη, δηλ. υπάρχει μετάθεση $\sigma \in S_n$ τέτοια ώστε $b_i = a_{\sigma(i)}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Έστω ότι υπάρχει μετάθεση $\sigma \in S_n$ τέτοια ώστε $b_i = a_{\sigma(i)}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Θα δείξουμε ότι οι πίνακες A και B είναι όμοιοι. Θυμόμαστε ότι κάθε μετάθεση $\sigma \in S_n$ γράφεται ως γινόμενο ξένων κυκλικών μεταθέσεων και ότι κάθε μετάθεση αντιστοιχεί σε έναν στοιχειώδη πίνακα. Για παράδειγμα έστω

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_3 \end{bmatrix}.$$

Θέλουμε να αντιμεταθέσουμε την τρίτη με την πρώτη γραμμή του πίνακα. Εφαρμόζουμε τους πίνακες

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

και $P^{-1} = P$ στον πίνακα C :

$$P^{-1}CP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{bmatrix}.$$

Στό ζητούμενο, από υπόθεση, υπάρχουν στοιχειώδεις πίνακες P_i , $i \in \{1, \dots, m\}$ τέτοιοι ώστε

$$(P_m P_{m-1} \dots P_1) \begin{bmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{bmatrix} (P_1 P_2 \dots P_m) = \begin{bmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{bmatrix},$$

και αφού $P_i = P_i^{-1}$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, έπεται ότι

$$(P_m^{-1} P_{m-1}^{-1} \dots P_1^{-1}) \begin{bmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{bmatrix} (P_1 P_2 \dots P_m) = \begin{bmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{bmatrix}$$

και άρα οι πίνακες A και B είναι όμοιοι.

Παράρτημα Θα δούμε τώρα μια εφαρμογή του χαρακτηριστικού πολυνύμου στις διαφορικές εξισώσεις.

Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων:

Έστω $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια διαφορίσιμη συνάρτηση. Υπενθυμίζουμε ότι αν $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης $y'(t) = \lambda y(t)$ είναι οι $y(t) = ce^{\lambda t}$, $c \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε το σύστημα

$$\begin{cases} x_1'(t) &= a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 \\ x_2'(t) &= b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 \\ x_3'(t) &= c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \end{cases}$$

με αρχική συνθήκη $(x_1(0), x_2(0), x_3(0)) = (d_1, d_2, d_3) \in \mathbb{R}^3$, όπου οι $x_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$ είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Θα προσδιορίσουμε όλες τις μή τετριμμένες λύσεις του πιο πάνω συστήματος. Θεωρούμε την απεικόνιση διάνυσμα λύσης

$$x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad \text{με} \quad t \mapsto x(t) := \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}.$$

Η αντίστοιχη παράγωγος της x είναι η

$$x' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad \text{με} \quad t \mapsto x'(t) := \begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_3'(t) \end{bmatrix}.$$

Έστω

$$A := \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

ο πίνακας των συντελεστών του συστήματος. Έστω λ_i , $i = 1, 2, 3$ οι (όχι καταναγκη διακεκριμένες) ιδιοτιμές του πίνακα A . ΑΝ ο A είναι διαγωνοποιήσιμος τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση: Υπάρχουν αντιστρέψιμοι πίνακες $P, Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιοι ώστε οι στήλες του P να αποτελούνται από ιδιοδιανύσματα του A και ο

$$Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

και τέτοιοι ώστε

$$P^{-1}AP = Q. \tag{6}$$

Τότε $A = PQP^{-1}$ και το αρχικό σύστημα γράφεται στη μορφή $x'(t) = Ax(t) = PQP^{-1}x(t) \Rightarrow P^{-1}x'(t) = QP^{-1}x(t)$. Ορίζουμε τη συνάρτηση

$$y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad \text{με} \quad t \mapsto y(t) := P^{-1}x(t).$$

Τότε $y'(t) := P^{-1}x'(t) = QP^{-1}x(t) = Qy(t)$. Το σύστημα αυτό είναι της μορφής

$$\begin{bmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 y_1(t) \\ \lambda_2 y_2(t) \\ \lambda_3 y_3(t) \end{bmatrix}$$

με αντίστοιχες λύσεις

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ c_3 e^{\lambda_3 t} \end{bmatrix},$$

όπου $c_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$. Από τη σχέση $y(t) = P^{-1}x(t)$ παίρνουμε $x(t) = Py(t)$. Τέλος, από τις αρχικές συνθήκες προσδιορίζουμε τους συντελεστές c_i , $i = 1, 2, 3$.

Παράδειγμα Θεωρούμε το σύστημα

$$\begin{cases} x'_1(t) = 2x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x'_2(t) = -x_1 + 3x_2 - x_3 \\ x'_3(t) = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 \end{cases}$$

με αρχική συνθήκη $(x_1(0), x_2(0), x_3(0)) = (1, 0, 0)$ όπου οι $x_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$ είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Θα προσδιορίσουμε όλες τις μή τετριμμένες λύσεις του συστήματος. Ακολουθώντας την πιο πάνω διαδικασία με

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

του οποίου το $\chi_A(t) = (t-1)(t-2)(t-5)$ και άρα $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 5$ με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα της μορφής $t(0, 1, 2)$, $k(-1, 1, 2)$, $l(-1, 1, -1)$, $t, k, l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Έτσι,

$$P := \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad Q := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Οι λύσεις του συστήματος $y'(t) = Qy(t)$ είναι της μορφής

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^{2t} \\ c_3 e^{5t} \end{bmatrix}.$$

Τότε,

$$y(t) = P^{-1}x(t) \Rightarrow x(t) = Py(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^{2t} \\ c_3 e^{5t} \end{bmatrix},$$

δηλ.

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_2 e^{2t} - c_3 e^{5t} \\ c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{5t} \\ 2c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} - c_3 e^{5t} \end{bmatrix}.$$

Τέλος, χρησιμοποιώντας τις αρχικές συνθήκες (με μέθοδο απαλοιφής του Gauss ή με απλή μέθοδο αντικατάστασης κτλ) βρίσκουμε ότι $c_1 = 1$, $c_2 = -1$, $c_3 = 0$. Έτσι, οι λύσεις

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

του συστήματος είναι της μορφής

$$\begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^t - e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ IV - Ιδιότητες χαρακτηριστικού πολυωνύμου

Άσκηση 1 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ένας πίνακας με χαρακτηριστικό πολυώνυμο χ_A . Προσδιορίστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του $-A$.

Άσκηση 2 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ένας αντιστρέψιμος πίνακας. Προσδιορίστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A^{-1} .

Άσκηση 3 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Δείξτε ότι $\chi_A(\lambda) = \chi_{A^T}(\lambda)$.

Άσκηση 4 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Δείξτε ότι οι πίνακες A και A^T έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές. Έχουν τα ίδια ιδιοδιανύσματα;

$$V(1) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Άσκηση 5 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

καθώς και του A^T .

Άσκηση 6 Έστω $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_{n \times n}(K)$ ένας τριγωνικός πίνακας. Να δείξετε ότι

$$\chi_A(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t) \dots (a_{nn} - t).$$

Άσκηση 7 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Άσκηση 8 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Άσκηση 9 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Άσκηση 10 Για ποιές τιμές του $k \in \mathbb{R}$ έχει ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ιδιοτιμή ίση με 1;

Άσκηση 11 Βρείτε τις ιδιοτιμές του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 12 (i) Έστω $A \in M_{n \times n}(K)$ ένας πίνακας της μορφής

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & & * \\ \vdots & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & 0 & & A_k \end{bmatrix},$$

όπου $A_i \in M_{n_i \times n_i}(K)$ και $\sum_{i=1}^k n_i = n$. Τότε,

$$\chi_A(x) = \chi_{A_1}(x) \chi_{A_2}(x) \cdots \chi_{A_k}(x).$$

(ii) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a & b \\ 1 & 2 & c & d \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Άσκηση 13 Δείξτε ότι όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό πολυώνυμο. Ισχύει το αντίστροφο;

Άσκηση 14 Έστω $A \in M_{n \times n}(K)$ με

$$\chi_A(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_0.$$

Δείξτε ότι

$$a_0 = \det(A) \quad \text{και} \quad a_{n-1} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A).$$

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ IV - Ιδιότητες χαρακτηριστικού πολυωνύμου

Άσκηση 15 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ένας πίνακας με χαρακτηριστικό πολυώνυμο χ_A . Προσδιορίστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του $-A$.

Λύση

$$\chi_{-A}(\lambda) = |-A - \lambda I_{n \times n}| = (-1)^n |A + \lambda I_{n \times n}| = (-1)^n \chi_A(-\lambda).$$

Άσκηση 16 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ένας αντιστρέψιμος πίνακας. Προσδιορίστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A^{-1} .

Λύση

$$\begin{aligned} \chi_{A^{-1}}(\lambda) &= |A^{-1} - \lambda I_{n \times n}| = |A^{-1}(I_{n \times n} - \lambda A)| = |A^{-1}| \cdot |I_{n \times n} - \lambda A| = \\ &= |A^{-1}| \cdot \left| \lambda \left(\frac{1}{\lambda} I_{n \times n} - A \right) \right| = \frac{1}{|A|} \lambda^n \cdot \left| \frac{1}{\lambda} I_{n \times n} - A \right| = \frac{\lambda^n}{|A|} \chi_A(1/\lambda). \end{aligned}$$

Άσκηση 17 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Δείξτε ότι $\chi_A(\lambda) = \chi_{A^T}(\lambda)$.

ΛΥΣΗ Έχουμε:

$$\chi_{A^T}(\lambda) = |A^T - \lambda I_{n \times n}| = |A^T - (\lambda I_{n \times n})^T| = |(A - \lambda I_{n \times n})^T| = |A - \lambda I_{n \times n}| = \chi_A(\lambda).$$

Άσκηση 18 Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Δείξτε ότι οι πίνακες A και A^T έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές. Έχουν τα ίδια ιδιοδιανύσματα;

Λύση Από την προηγούμενη Άσκηση, $\chi_A(t) = \chi_{A^T}(t)$, άρα ο A και A^T έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές. Όμως, δεν έχουν (εν γένει) τα ίδια ιδιοδιανύσματα, για παράδειγμα,

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Τότε,

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ με ιδιόχωρο

$$V(1) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Οι ιδιοτιμές του A^T είναι $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ με ιδιόχωρο

$$V(1) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Άσκηση 19 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

καθώς και του A^T .

Λύση Έχουμε

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= |A - tI_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} 3-t & 2 \\ 1 & 2-t \end{vmatrix} = (3-t)(2-t) - 2 \cdot 1 \\ &= t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4). \end{aligned}$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές του A είναι οι 1, 2. Επίσης, από προηγούμενη άσκηση, $\chi_A(t) = \chi_{A^T}(t)$.
Εύρεση Ιδιοχώρων του A :

$$\begin{aligned} V(1) &= \ker\{(A - I_{2 \times 2})X \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid x = -y\} \\ &= \{(x, -x)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid x \neq 0\} \\ &= \text{span}\{(1, -1,)^T\} \setminus \{(0, 0)^T\} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} V(2) &= \ker\{(A - 2I_{2 \times 2})X \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid x = 2y\} \\ &= \{(2y, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid y \neq 0\} \\ &= \text{span}\{(2, 1,)^T\} \setminus \{(0, 0)^T\}. \end{aligned}$$

Επίσης, κάθε γραμμικός συνδυασμός

$$v = k(1, -1) + m(2, 1), \quad k \cdot m \neq 0$$

είναι ιδιοδιάνυσμα του A .

Εύρεση Ιδιοχώρων του A^T :

$$\begin{aligned} V(1) &= \ker\{(A^T - I_{2 \times 2})X \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid 2x + y = 0\} \\ &= \text{span}\{(1, -2,)^T\} \setminus \{(0, 0)^T\} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} V(2) &= \ker\{(A^T - 2I_{2 \times 2})X \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid x = y, x \neq 0\} \\ &= \{(x, x)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid x \neq 0\} \\ &= \text{span}\{(1, 1,)^T\} \setminus \{(0, 0)^T\}. \end{aligned}$$

Επίσης, κάθε γραμμικός συνδυασμός

$$v = k(1, -2) + m(1, 1), \quad k \cdot m \neq 0$$

είναι ιδιοδιάνυσμα του A^T .

Άσκηση 20 Έστω $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_{n \times n}(K)$ ένας τριγωνικός πίνακας. Να δείξετε ότι

$$\chi_A(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t) \dots (a_{nn} - t).$$

Λύση Υπενθυμίζουμε τι είναι τριγωνικός πίνακας:

Ένας πίνακας της μορφής

$$L = \begin{bmatrix} a_{1,1} & & & & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & & \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

λέγεται κάτω τριγωνικός (ή αριστερά τριγωνικός). Ένας πίνακας της μορφής

$$U = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} & \dots & b_{1,n} \\ & b_{2,2} & b_{2,3} & \dots & b_{2,n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & b_{n-1,n} \\ 0 & & & & b_{n,n} \end{bmatrix}$$

λέγεται άνω τριγωνικός (ή δεξιά τριγωνικός). Ένας διαγώνιος πίνακας είναι ταυτόχρονα άνω και κάτω τριγωνικός.

Ξέρουμε ότι αν $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ είναι ένας άνω ή κάτω τριγωνικός πίνακας, τότε $\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$. Συνεπώς,

$$\chi_A(t) = \det(A - tI_{n \times n}) = (a_{11} - t) \dots (a_{nn} - t) = (-1)^n (t - a_{11}) \dots (t - a_{nn}).$$

Άσκηση 21 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Λύση Αφού A διαγώνιος, έπεται ότι

$$\chi_A(t) = (-1)^3 (t - 2)(t - 1)(t + 1).$$

Συνεπώς, ο A είναι διαγωνίσιμος, αφού έχει τρεις διακεκριμένες ιδιοτιμές, τις $\pm 1, 2$. Εύρεση Ιδιοχώρων του A :

$$\begin{aligned} E(1) &= V(1) = \ker\{(A^t - I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\ &= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x = z = 0\} \\ &= \text{span}\{(0, 1, 0)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(-1) &= \ker\{(A^t + I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\
&= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x = y = 0\} \\
&= \{(0, 0, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid z \neq 0\} \\
&= \text{span}\{(0, 0, 1)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}
\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}
V(2) &= \ker\{(A^t - 2I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\
&= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid y = z = 0\} \\
&= \{(x, 0, 0)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x \neq 0\} \\
&= \text{span}\{(1, 0, 0)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}
\end{aligned}$$

Έχουμε

$$\mathbb{R}^{3 \times 1} = V(1) \oplus V(-1) \oplus V(2).$$

Άσκηση 22 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Λύση Έχουμε

$$\begin{aligned}
\chi_A(t) &= |A - tI_{3 \times 3}| = \begin{vmatrix} 1-t & -1 & 0 \\ 0 & 2-t & 0 \\ -1 & -1 & 2-t \end{vmatrix} = (2-t) \begin{vmatrix} 1-t & 1 \\ 0 & 2-t \end{vmatrix} \\
&= (2-t)(2-t)(1-t) = -(t-2)^2(t-1).
\end{aligned}$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές του A είναι οι 1, 2. Η ιδιοτιμή 2 έχει αλγεβρική πολλαπλότητα 2. Εύρεση Ιδιοχώρων του A :

$$\begin{aligned}
V(1) &= \ker\{(A - I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\
&= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x = z, y = 0\} \\
&= \{(z, 0, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid z \neq 0\} \\
&= \text{span}\{(1, 0, 1)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}
\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}
V(2) &= \ker\{(A - 2I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\
&= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid x = -y\} \\
&= \{(-y, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid y \cdot z \neq 0\} \\
&= \text{span}\{(-1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}.
\end{aligned}$$

Έχουμε $\dim_{\mathbb{R}}(V(1)) = 1$ και $\dim_{\mathbb{R}}(V(2)) = 2$. Συνεπώς, Έχουμε $\dim_{\mathbb{R}}(V(1)) + \dim_{\mathbb{R}}(V(2)) = 3 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^{3 \times 1})$. Έτσι,

$$\mathbb{R}^{3 \times 1} = V(1) \oplus V(2).$$

Άσκηση 23 Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Λύση Έχουμε

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= |A - tI_{3 \times 3}| = \begin{vmatrix} 4-t & 0 & 3 \\ 0 & 2-t & 0 \\ -3 & 0 & 4-t \end{vmatrix} = (2-t)(t^2 - 8t + 25) \\ &= -(t-2)(t^2 - 8t + 25). \end{aligned}$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές του A είναι

$$t_1 = 2, \quad t_{2,3} = 4 \pm 3i.$$

Είναι $|t_2| = |t_3| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ και $\arg(t_2) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$.

$$t_2 = |t_2|e^{i\arg(t_2)}.$$

Εύρεση Ιδιοχώρων του A :

$$\begin{aligned} V(1) &= \ker\{(A - 2I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{C}^{3 \times 1}\} \\ &= \mathbb{C} - \text{span}\{(0, 1, 0)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(4 + 3i) &= \ker\{(A - (4 + 3i)I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{C}^{3 \times 1}\} \\ &= \mathbb{C} - \text{span}\{(-i, 0, 1)^T\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} V(4 - 3i) &= \ker\{(A - (4 - 3i)I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{C}^{3 \times 1}\} \\ &= \mathbb{C} - \text{span}\{(i, 0, 1)^T = \overline{(-i, 0, 1)}\} \setminus \{(0, 0, 0)^T\}. \end{aligned}$$

Έχουμε $\dim_{\mathbb{R}}(V(1)) = 1$ και $\dim_{\mathbb{R}}(V(2)) = 2$. Συνεπώς,

$$\dim_{\mathbb{R}}(V(1)) + \dim_{\mathbb{R}}(V(2)) = 3 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^{3 \times 1}).$$

Έτσι,

$$\mathbb{R}^{3 \times 1} = V(1) \oplus V(2).$$

Άσκηση 24 Για ποιές τιμές του $k \in \mathbb{R}$ έχει ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ιδιοτιμή ίση με 1;

Λύση Έχουμε

$$\begin{aligned}\chi_A(t) &= |A - tI_{3 \times 3}| = \begin{vmatrix} k-t & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & k \\ 0 & 2 & 1-t \end{vmatrix} = (k-t) \begin{vmatrix} 1-t & k \\ 2 & 1-t \end{vmatrix} = (k-t)[t^2 - 2t + 1 - 2k] \\ &= -(t-k)(t^2 - 2t + 1 - 2k).\end{aligned}$$

Το πολυώνυμο $t^2 - 2t + 1 - 2k$ έχει ρίζες τους αριθμούς $1 \pm \sqrt{2k}$. Έτσι, για να έχει ιδιοτιμή 1 ο πίνακας A , θα πρέπει $k = 1$ ή $1 \pm \sqrt{2k} = 1 \Leftrightarrow k = 0$.

Άσκηση 25 Βρείτε τις ιδιοτιμές του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}.$$

Λύση Έχουμε

$$\begin{aligned}\chi_A(t) &= |A - tI_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} \cos \phi - t & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{vmatrix} = t^2 - 2t \cos \phi + \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \\ &= t^2 - 2t \cos \phi + 1.\end{aligned}$$

Επομένως, οι ιδιοτιμές του A είναι οι

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \cos \phi \pm \sqrt{4 \cos^2 \phi - 4}}{2} = \cos \phi \pm i \sin \phi = e^{\pm i \phi}.$$

Σημείωση: Η απεικόνιση

$$f: \mathbb{R}^{2 \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 1} \quad \text{με} \quad f \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \phi + y \sin \phi \\ -x \sin \phi + y \cos \phi \end{bmatrix}$$

είναι η απεικόνιση στροφής κατά γωνία ϕ .

Άσκηση 26 (i) Έστω $A \in M_{n \times n}(K)$ ένας πίνακας της μορφής

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & * \\ \vdots & A_2 & \\ & & \ddots \\ & 0 & & A_k \end{bmatrix},$$

όπου $A_i \in M_{n_i \times n_i}(K)$ και $\sum_{i=1}^k n_i = n$. Τότε,

$$\chi_A(x) = \chi_{A_1}(x) \chi_{A_2}(x) \cdots \chi_{A_k}(x).$$

(ii) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a & b \\ 1 & 2 & c & d \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Λύση

(i) Με επαγωγή στο k .

Για $k = 1$, έχουμε ότι $A = (A_1) \Rightarrow \chi_A(t) = \chi_{A_1}(t)$.

Έστω ότι ισχύει για $k = m$, δηλ. για τον πίνακα

$$B = \begin{bmatrix} A_1 & & & * \\ \vdots & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & 0 & & A_m \end{bmatrix},$$

ισχύει ότι

$$\chi_B t = \chi_{A_1}(t) \cdots \chi_{A_m}(t). \quad (7)$$

Τότε,

$$A = \begin{bmatrix} B & & * \\ 0 & A_{m+1} & \end{bmatrix}.$$

Από το επαγωγικό βήμα για $n = 2$ και την (7) έπεται ότι

$$\chi_A(t) = \chi_B(t) \cdot \chi_{A_{m+1}}(t) = \chi_{A_1}(t) \cdots \chi_{A_m}(t).$$

(ii) Θέτουμε $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ και $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$. Τότε,

$$\chi_{A_1}(t) = (t-1)(t-3), \quad \chi_{A_2}(t) = (t-2)(t-3).$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & * \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

και από το προηγούμενο ερώτημα,

$$\chi_A(t) = \chi_{A_1}(t) \cdot \chi_{A_2}(t) = (t-1)(t-2)(t-3)^2.$$

Άσκηση 27 Δείξτε ότι όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

Ισχύει το αντίστροφο;

Λύση Έστω $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ όμοιοι πίνακες. Τότε, υπάρχει $P \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ αντιστρέψιμος τέτοιος ώστε

$$B = P^{-1}AP. \quad (8)$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} \chi_B(t) &= \det(B - tI_{n \times n}) \stackrel{(8)}{=} \det(P^{-1}AP - tI_{n \times n}) \\ &= \det[(P^{-1}(A - tI_{n \times n})P = \det(P^{-1}) \cdot \det(A - tI_{n \times n}) \cdot \det(P) \\ &= \det(P^{-1}P) \cdot \det(A - tI_{n \times n}) \\ &= \det(A - tI_{n \times n}) = \chi_A(t). \end{aligned}$$

Το αντίστροφο δεν ισχύει. Για παράδειγμα, αν $A := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ και $B := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, έχουμε ότι

$$\chi_A(t) = (t-1)^2 = \chi_B(t)$$

αλλά A, B όχι όμοιοι: αν ήταν, θα υπήρχε αντιστρέψιμος πίνακας $P \in M_{2 \times 2}(\mathbb{F})$ με $P^{-1}AP = B$. Αλλά,

$$P^{-1}AP \stackrel{A=I_{2 \times 2}}{=} P^{-1}P = I_{2 \times 2} = A \neq B,$$

άτοπο.

Άσκηση 28 Έστω $A \in M_{n \times n}(K)$ με

$$\chi_A(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0.$$

Δείξτε ότι

$$a_0 = \det(A) \quad \text{και} \quad a_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr}(A).$$

Λύση Έχουμε

$$a_0 = \chi_A(0) = \det(A - 0I_{n \times n}) = \det(A).$$

Επίσης, αν $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n$, τότε,

$$\chi_A(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t) \dots (a_{nn} - t) + p(t),$$

όπου $p \in P_{n-2}[t]$, δηλ. $\deg(P) \leq n-2$. Τότε,

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= (a_{11} - t)(a_{22} - t) \dots (a_{nn} - t) + p(t) \\ &= (-1)^{n-1} (a_{11} + \dots + a_{nn}) t^{n-1} + \text{υπόλοιποι όροι} \\ \Rightarrow a_{n-1} &= (-1)^{n-1} \text{tr}(A). \end{aligned}$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Έπεται ότι ένας $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ είναι αντιστρέψιμος $\Leftrightarrow$ ο σταθερός όρος του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου είναι $\neq 0$. Αν $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, τότε κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο $\phi(t)$ επί του $\mathbb{C}$ έχει $\# \deg(\phi)$ ρίζες στο $\mathbb{C}$, όχι κατανάγκην διακεκριμένες. Έστω λοιπόν ότι το $\chi_A(t)$ έχει ρίζες τις λ_i , $1 \in \{1, 2, \dots, n\}$. Τότε

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= (-1)^n (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_n) \\ \Rightarrow \chi_A(0) &= (-1)^n (-1)^n \lambda_1 \dots \lambda_n = \det(A), \end{aligned}$$

από το προηγούμενο. Επίσης, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Γραμμική Άλγεβρα

Ασκήσεις V- Ελάχιστο πολυώνυμο, Διαγωνισιμότητα, Θεώρημα Cayley-Hamilton

Ορισμός 0.0.7 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f \in \text{End}(V)$. Τότε, υπάρχει μοναδικό πολυώνυμο $m_f \in \mathbb{F}[t]$ τέτοιο ώστε

- (i) $m_f(t) \neq 0$, $m_f(f) = 0$ και ο μεγιστοβάθμιος του συντελεστής είναι το 1.
- (ii) Αν $\phi \in \mathbb{F}[t]$ με $\phi(f) = 0$, τότε $m_f(t)/\phi(t)$.

Πόρισμα 0.0.3 Ισχύει

$$m_f(t)/\chi_f(t).$$

Δηλ. το $m_f(t)$ είναι το πολυώνυμο με το μικρότερο βαθμό (με μεγιστοβάθμιο συντελεστή 1) τέτοιο ώστε $m_f(f) = 0$. Επίσης,

$$\text{Ρίζες του } \chi_f(t) = \text{Ρίζες του } m_f(t).$$

Θεώρημα 0.0.1 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f \in \text{End}(V)$. Η f είναι διαγωνίσιμη $\Leftrightarrow m_f(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_k)$, όπου λ_i , $1 \leq i \leq n$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές της f .

Πόρισμα 0.0.4 Ένας $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ είναι όμοιος προς διαγώνιο $\Leftrightarrow m_f(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_k)$, όπου λ_i , $1 \leq i \leq n$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές της f .

Θεώρημα 0.0.2 Έστω

$$A = \begin{bmatrix} B_1 & & & 0 \\ & B_2 & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & B_k \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n},$$

όπου $B_i \in \mathbb{F}^{\sigma_i \times \sigma_i}$, $\sigma_1 + \dots + \sigma_k = n$. Τότε,

$$m_A(t) = \varepsilon.\kappa.\pi.(m_{B_1}(t), \dots, m_{B_k}(t)).$$

Πρόταση 0.0.8 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f \in \text{End}(V)$. Αν W είναι ένας f -αναλλοίωτος υπόχωρος του V (δηλ. $f(W) \subseteq W$, $W \neq 0_V$) τότε

$$m_{f|_W}(t)/m_f(t).$$

Άσκηση 4 Σωστό ή λάθος; Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Θεωρούμε ως P τον πίνακα που έχει στήλες τα ιδιοδιανύσματα του A . Αν οι στήλες του P είναι γραμμικά ανεξάρτητες, τότε

- (i) Ο A είναι αντιστρέψιμος.
- (ii) Ο A είναι διαγωνίσιμος.

(iii) Ο P είναι αντιστρέψιμος.

(iv) Ο P είναι διαγωνίσιμος.

Άσκηση 5 Έστω $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ με $\chi_A(t) = -t^3 + 3t^2 - 2t$.

1. Είναι ο A αντιστρέψιμος;
2. Ποιό είναι το ίχνος του A ;
3. Είναι ο πίνακας $(A - 9I_{3 \times 3})(A - 7I_{3 \times 3})$ αντιστρέψιμος;
4. Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα $A^2 + A - 16I_{3 \times 3}$.
5. Υπολογίστε το $\chi_{A^2}(t)$.

Άσκηση 6 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Βρείτε το $m_A(t)$.

Άσκηση 7 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Βρείτε το $m_A(t)$.

Άσκηση 8 Έστω η $f \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ με $f(x, y) = (2x + 5y, 6x + y)$. Βρείτε το $m_f(t)$.

Άσκηση 9 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Βρείτε τα $\chi_A(t)$ και $m_A(t)$.

Άσκηση 10 Να προσδιοριστούν οι πίνακες $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ τέτοιοι ώστε $A^2 - 3A + 2I_{2 \times 2} = 0$.

Άσκηση 11 Έστω V διανυσματικός χώρος επί του σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Αν $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ δύο διακεκριμένες ιδιοτιμές της f , δείξτε ότι

$$\dim(V(\lambda) + V(\mu)) = \dim(V(\lambda)) + \dim(V(\mu)).$$

Άσκηση 12 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Δείξτε ότι ο A είναι διαγωνίσιμος και ακολούθως βρείτε πίνακες P και Q τέτοιους ώστε $A = PQP^{-1}$.

Άσκηση 13 Διαγωνοποιείστε τον πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 14 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Δείξτε ότι ο A είναι διαγωνίσιμος και ακολούθως βρείτε πίνακες P και Q τέτοιους ώστε $A = PQP^{-1}$.

Άσκηση 15 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Υπολογίστε τον A^{13} .

Άσκηση 16 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) = n < \infty$. Έστω $A = (f : \hat{a}, \hat{a})$ ο πίνακας αναπαραστάσης της f ως προς μια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του V και λ μια ιδιοτιμή του A , τότε,

$$\dim(V(\lambda)) = n - \text{rank}(A - \lambda I_{n \times n}).$$

Άσκηση 17 Να βρεθεί η διάσταση του (μοναδικού) ιδιόχωρου του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & a & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}.$$

Άσκηση 18 Να βρεθεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα $a, b, c \in \mathbb{R}$ έτσι ώστε ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ a & 3 & 0 \\ b & c & -2 \end{bmatrix}$$

να διαγωνοποιείται.

Θεώρημα 0.0.3 (Cayley-Hamilton) Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Τότε, $\chi_A(A) = 0_{n \times n}$.

Το πιο πάνω Θεώρημα μας λέει έναν τρόπο να μειώσουμε τις δυνάμεις πινάκων. Ο τρόπος είναι: Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $p \in \mathbb{P}_n[t]$. Αν $\chi_A(t)$ το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A , ο Ευκλείδειος Αλγόριθμος Διάρθρωσης του p με το χ_A μας δίνει:

$$p(t) = q(t)\chi_A(t) + r(t),$$

όπου το $q(t)$ βρίσκεται μέσω της διαδικασίας της μακράς διαίρεσης και q πολυώνυμο βαθμού το πολύ $n - 1$. Αν λ_i , $1 \leq i \leq k$ οι (διακεκριμένες) ιδιοτιμές του A , τότε $\chi_A(\lambda_i) = 0$, $1 \leq i \leq k$. Έτσι,

$$p(\lambda_i) = q(\lambda_i). \quad (9)$$

Αλλά από το Θεώρημα Cayley-Hamilton είναι $\chi_A(A) = 0$, άρα

$$p(A) = q(A)\chi_A(A) + r(A) = r(A).$$

Οι συντελεστές του $r(A)$ καθορίζονται από τις εξισώσεις (9).

Άσκηση 19 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Απλοποιείστε τον πίνακα $A^5 - 2A^4 + 3I_{3 \times 3}$.

Άσκηση 20 Έστω $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ με $x_A(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$, $b \neq 0$. Υπολογίστε τους A^3 και A^{-1} .

Άσκηση 21 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ένας αντιστρέψιμος πίνακας. Εκφράστε τον A^{-1} ως γραμμικό συνδυασμό δυνάμεων του A τάξης το πολύ $n - 1$.

Άσκηση 22 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Υπολογίστε τον A^{-1} .

Άσκηση 23 Έστω $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^4 = 0_{3 \times 3}$. Ισχύει ότι $A^3 = 0_{3 \times 3}$; Αν όμως $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^3 = 0_{3 \times 3}$, ισχύει ότι $A^2 = 0_{3 \times 3}$;

Άσκηση 24 Έστω $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ με μόνη ιδιοτιμή τη $\lambda = 0$. Δείξτε ότι $A^n = 0_{n \times n}$.

Άσκηση 25 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ με $A^m = 0_{n \times n}$ για κάποιο $m \in \mathbb{Z}_+$, δηλ. ο A είναι μηδενοδύναμος. Δείξτε ότι ο A διαγωνοποιείται αν και μόνο αν $A = 0_{n \times n}$.

Άσκηση 26 Βρείτε ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού που να έχει ρίζα τον πίνακα

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 27 Βρείτε τον A^5 , όπου

$$A := \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 28 Να βρεθούν τα χαρακτηριστικά πολυώνυμα των πινάκων

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

και να εξεταστεί αν αυτοί είναι όμοιοι.

Άσκηση 29 Δείξτε ότι όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο ελάχιστο πολυώνυμο. Ισχύει το αντίστροφο;

Άσκηση 30 Έστω $f : V \rightarrow V$ μια γραμμική απεικόνιση τέτοια ώστε $f^3 = 9f$. Δείξτε ότι η f είναι διαγωνοποιήσιμη.

Άσκηση 31 Έστω $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ με

$$f(x, y, z) = (7x - y - 2z, -x + 7y + 2z, -2x + 2y + 10z).$$

Να εξεταστεί αν η f είναι διαγωνοποιήσιμη.

Άσκηση 32 Να δείχθει ότι αν $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, τότε $m_A(t) = m_{A^T}(t)$.

Άσκηση 33 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$ και τέτοιος ώστε $V = V_1 \oplus V_2$, όπου V_1, V_2 f -αναλλοίωτοι υπόχωροι του V . Δείξτε ότι

$$m_f(t) = \varepsilon.\kappa.\pi.(m_{f|_{V_1}}(t), m_{f|_{V_2}}(t)).$$

Γραμμική Άλγεβρα

Ασκήσεις V- Ελάχιστο πολυώνυμο, Διαγωνισιμότητα, Θεώρημα Cayley-Hamilton

Άσκηση 1 Σωστό ή λάθος; Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Θεωρούμε ως P τον πίνακα που έχει στήλες τα ιδιοδιανύσματα του A . Αν οι στήλες του P είναι γραμμικά ανεξάρτητες, τότε

- (i) Ο A είναι αντιστρέψιμος.
- (ii) Ο A είναι διαγωνίσιμος.
- (iii) Ο P είναι αντιστρέψιμος.
- (iv) Ο P είναι διαγωνίσιμος.

Λύση

- (i) Λάθος, γιατί δεν ξέρουμε ποιές είναι οι ιδιοτιμές του A .
- (ii) Σωστό.
- (iii) Σωστό.
- (iv) Δε γνωρίζουμε, αφού δεν ξέρουμε τα ιδιοδιανύσματα του P .

Άσκηση 2 Έστω $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ με $\chi_A(t) = -t^3 + 3t^2 - 2t$.

1. Είναι ο A αντιστρέψιμος;
2. Ποιά είναι το ίχνος του A ;
3. Είναι ο πίνακας $(A - 9I_{3 \times 3})(A - 7I_{3 \times 3})$ αντιστρέψιμος;
4. Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα $A^2 + A - 16I_{3 \times 3}$.
5. Υπολογίστε το $\chi_{A^2}(t)$.

Λύση

1. Ξέρουμε ότι $\det(A) = 0$ σταθερός όρος στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A . Εδώ, ο σταθερός όρος είναι $0 = \det(A)$ και άρα ο A δεν είναι αντιστρέψιμος.
2. Από προηγούμενη Άσκηση, έχουμε ότι $3 = (-1)^{3-1} \text{tr}(A)$ και άρα $\text{tr}(A) = 3$.
3. Έχουμε ότι

$$\det(A - tI_{3 \times 3}) = \chi_A(t) = -t^3 + 3t^2 - 2t = -t(t^2 - 3t + 2) = -t(t-1)(t-2)$$

και άρα οι ιδιοτιμές του A είναι οι 0, 1, 2. Άρα, αφού οι αριθμοί 7, 9 δεν είναι ιδιοτιμές του A , έπεται ότι $\det(A - 9I_{3 \times 3}) \neq 0$ και $\det(A - 7I_{3 \times 3}) \neq 0$. Έτσι,

$$\det[(A - 9I_{3 \times 3})(A - 7I_{3 \times 3})] = \det(A - 9I_{3 \times 3}) \det(A - 7I_{3 \times 3}) \neq 0$$

και άρα ο πίνακας αυτός είναι αντιστρέψιμος.

4. Έχουμε

$$\begin{aligned}\det(A^2 + A - 16I_{3 \times 3}) &= \det[(A - 8I_{3 \times 3})(A + 2I_{3 \times 3})] \\ &= \det(A - 8I_{3 \times 3}) \det(A + 2I_{3 \times 3}) = \chi_A(7)\chi_A(9).\end{aligned}$$

5. Από προηγούμενη Άσκηση ξέρουμε ότι αν λ ιδιοτιμή του A και $p \in \mathbb{C}_n[t]$, τότε $p(\lambda)$ ιδιοτιμή του $p(A)$. Έτσι, αν $p(t) = t^2$ και λ ιδιοτιμή του A , τότε $p(\lambda) = \lambda^2$ ιδιοτιμή του A^2 . Έτσι, οι ιδιοτιμές του A^2 είναι οι 0, 4, 64. Συνεπώς,

$$\chi_{A^2}(t) = -t(t-4)(t-64).$$

Άσκηση 3 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Βρείτε το $m_A(t)$.

Λύση Έχουμε

$$\chi_A(t) = |A - tI_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} 3-t & -2 \\ 0 & -3-t \end{vmatrix} = -(t-3)(t+3).$$

Αφού $m_A(t)/\chi_A(t)$ έπεται ότι $m_A(t) = \chi_A(t)$.

Άσκηση 4 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Βρείτε το $m_A(t)$.

Λύση Έχουμε

$$\chi_A(t) = |A - tI_{3 \times 3}| = -(t-2)^2(t-3).$$

Αφού $m_A(t)/\chi_A(t)$, έπεται ότι είτε $m_A(t) = (t-2)(t-3)$ είτε $m_A(t) = (t-2)^2(t-3)$. Αλλά, $(A - 2I_{3 \times 3})(A - 3I_{3 \times 3}) = 0_{3 \times 3}$ (θυμόμαστε ότι πρέπει $m_A(A) = 0$) έπεται ότι $m_A(t) = (t-2)(t-3)$.

Άσκηση 5 Έστω η $f \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ με $f(x, y) = (2x + 5y, 6x + y)$. Βρείτε το $m_f(t)$.

Λύση Ο πίνακας της f ως προς τη συνήθη βάση του $\mathbb{R}^2$ είναι ο

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}.$$

Είναι $m_f(t) = m_A(t)$. Βρίσκουμε

$$\chi_A(t) = |A - tI_{2 \times 2}| = (t-7)(t+4).$$

Επομένως, $m_A(t) = \chi_A(t)$.

Άσκηση 6 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Βρείτε τα $\chi_A(t)$ και $m_A(t)$.

Λύση Έχουμε

$$\chi_A(t) = |A - tI_{3 \times 3}| = (-1)^3(x-2)^3,$$

αφού ο A είναι άνω τριγωνικός. Συνεπώς, είτε $m_A(t) = x - 2$, είτε $m_A(t) = (x - 2)^2$, είτε $m_A(t) = (x - 2)^3$. Αλλά, $(A - 2I_{3 \times 3}) \neq 0_{3 \times 3}$ και $(A - 2I_{3 \times 3})(A - 2I_{3 \times 3}) = 0_{3 \times 3}$, επομένως, $m_A(t) = (x - 2)^2$.

Άσκηση 7 Να προσδιοριστούν οι πίνακες $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ τέτοιοι ώστε $A^2 - 3A + 2I_{2 \times 2} = 0$.

Λύση Θεωρούμε το πολυώνυμο $\phi(t) = t^2 - 3t + 2 = (t - 1)(t - 2) \in \mathbb{R}_2[t]$. Θα πρέπει $m_A(t)/\phi(t)$. Συνεπώς, είτε $m_A(t) = t - 1$, είτε $m_A(t) = t - 2$, είτε $m_A(t) = (t - 1)(t - 2)$. Αν $m_A(t) = t - 1$, τότε $A = I_{2 \times 2}$. Αν $m_A(t) = t - 2$, τότε $A = 2I_{2 \times 2}$. Αν $m_A(t) = (t - 1)(t - 2)$, τότε, A διαγωνίσιμος με ιδιοτιμές 1, 2. Συνεπώς A όμοιος προς τον $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Άσκηση 8 Έστω V διανυσματικός χώρος επί του σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Αν $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ δύο διακεκριμένες ιδιοτιμές της f , δείξτε ότι

$$\dim(V(\lambda) + V(\mu)) = \dim(V(\lambda)) + \dim(V(\mu)).$$

Λύση Έχουμε ότι

$$\dim(V(\lambda) + V(\mu)) = \dim(V(\lambda)) + \dim(V(\mu)) - \dim(V(\lambda) \cap V(\mu)).$$

Αλλά $\dim(V(\lambda) \cap V(\mu)) = \{0\}$. Πράγματι, αν $u \in V(\lambda) \cap V(\mu)$, τότε $f(u) = \lambda u$ και $f(u) = \mu u$, δηλ. $(\lambda - \mu)u = 0$. Αλλά $\lambda \neq \mu$, επομένως, $u = 0$.

Άσκηση 9 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Δείξτε ότι ο A είναι διαγωνίσιμος και ακολούθως βρείτε πίνακες P και Q τέτοιους ώστε $A = PQP^{-1}$.

Λύση Ο A έχει ιδιοτιμές τις $\lambda_{1,2} = 1$, $\lambda_3 = 6$ με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα τα $x_{1,2} = t(2, 1, 0) + s(-1, 0, 1)$, $s, t \in \mathbb{C}$, $s, t \neq 0$ και $x_3 = r(1, -1, 2)$, $r \in \mathbb{C}$, $r \neq 0$. Για $t = s = r = 1$ παίρνουμε τα ιδιοδιανύσματα $(2, 1, 0)$, $(-1, 0, 1)$ και $(1, -1, 2)$. Η οριζούσα των 3 αυτών διανυσμάτων είναι $-5 \neq 0$, και άρα ο A είναι διαγωνίσιμος (ισοδύναμα, αφού $\dim V(\lambda_{1,2}) = 2$ και $\dim V(\lambda_3) = 1$) έπεται ότι A διαγωνίσιμος. Θέτουμε

$$Q := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

δηλ. ο Q είναι ο πίνακας με στοιχεία διαγωνίου τις ιδιοτιμές και αλλού μηδέν. Θέτουμε

$$P := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

και βρίσκουμε τον P^{-1} :

$$(P|I) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/5 & 3/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -2/5 & 4/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -2/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$

και αρα

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 3/5 & 1/5 \\ -2/5 & 4/5 & 3/5 \\ 1/5 & -2/5 & 1/5 \end{bmatrix}.$$

Έτσι, $A = PQP^{-1}$.

Άσκηση 10 Διαγωνοποιείστε τον πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

Λύση Έχουμε

$$\chi_A(t) = |A - tI_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} 5-t & 4 \\ 4 & -1-t \end{vmatrix} = -(5-t)(t+1) - 16 = t^2 - 4t - 21 = (t-7)(t+3).$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα είναι -3 και 7 . Ο A έχει δύο διακεκριμένες ιδιοτιμές, άρα διαγωνοποιείται. Εύρεση Ιδιοχώρων:

$$\begin{aligned} V(\lambda_1) &= V(7) = \{(A - 7I_{2 \times 2})X = 0 \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid y = 2x\} = \text{span}\{(2, 1)^T\} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} V(\lambda_2) &= V(-3) = \ker\{(A + 3I_{2 \times 2})X \mid X \in \mathbb{R}^{2 \times 1}\} \\ &= \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid y = -2x\} = \text{span}\{(1, -2)^T\}. \end{aligned}$$

Θέτουμε

$$Q := \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad P := \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Τότε, $A = P^{-1}QP$.

Άσκηση 11 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Δείξτε ότι ο A είναι διαγωνίσιμος και ακολούθως βρείτε πίνακες P και Q τέτοιους ώστε $A = PQP^{-1}$.

Λύση Ο A έχει ιδιοτιμές τις

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 1.$$

με αντίστοιχους ιδιοδιοχώρους

$$\begin{aligned} V(1) &= \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle \\ V(2) &= \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \\ V(3) &= \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Ο A διαγωνοποιείται αφού έχει τρία διακεκριμένα ιδιοδιανύσματα. Έστω

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Τότε, } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = Q.$$

Άσκηση 12 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Υπολογίστε τον A^{13} .

Λύση Παρατηρούμε ότι $A^2 = I_{3 \times 3} \Rightarrow A^{13} = AA^{12} = A(A^2)^6 = A$. Διαφορετικά, μπορούμε να ακολουθήσουμε την 'κλασική' οδό, αυτήν της διαγωνισιμότητας του A : Θα δείξουμε ότι ο A είναι διαγωνίσιμος και ακολούθως θα βρούμε πίνακες P και Q τέτοιους ώστε $A = PQP^{-1}$. Τότε, $A^{13} = PQ^{13}P^{-1}$.

Εύρεση Ιδιοτιμών:

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= |A - \lambda I_{3 \times 3}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 2 \\ 0 & -3-\lambda & 4 \\ 0 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -3-\lambda & 4 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda-1)^2(\lambda+1). \end{aligned}$$

Συνεπώς, οι ιδιοτιμές του A είναι οι $\lambda_1 = 1$ (διπλή) και $\lambda_2 = -1$.

Εύρεση Ιδιοχώρων:

$$\begin{aligned} V(\lambda_1) = V(1) &= \ker\{(A - \lambda_1 I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\ &= \{(A - \lambda_1 I_{3 \times 3})X = 0 \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\ &= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid y = z\} = \text{span}\{(1, 0, 0)^T, (0, 1, 1)^T\} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} V(\lambda_2) = V(2) &= \ker\{(A - \lambda_2 I_{3 \times 3})X \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\ &= \{(A - \lambda_2 I_{3 \times 3})X = 0 \mid X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}\} \\ &= \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid y = 2z, x = z\} = \text{span}\{(1, 2, 1)^T\}. \end{aligned}$$

Έχουμε ότι

$$\dim_{\mathbb{R}}(V(\lambda_1)) + \dim_{\mathbb{R}}(V(\lambda_2)) = 3 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3),$$

άρα ο A διαγωνοποιείται και μάλιστα $Q = P^{-1}AP$, όπου

$$Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Εύκολα βρίσκουμε ότι

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Τέλος,

$$\begin{aligned} A = PQP^{-1} \Rightarrow A^{13} = PQ^{13}P^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} = A. \end{aligned}$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το Θεώρημα Cayley-Hamilton μας λέει πως αν $A \in M_{n \times n}(K)$ τότε υπάρχει πολυώνυμο βαθμού n που έχει ως ρίζα τον A . Όμως, μπορεί να υπάρχει και πολυώνυμο βαθμού $< n$ που έχει ως ρίζα τον πίνακα. Για παράδειγμα στην άσκηση αυτή είδαμε ότι $A^2 = I_{3 \times 3}$ και άρα ο πίνακας A μηδενίζει το πολυώνυμο $p(t) = t^2 - 1$.

Άσκηση 13 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) = n < \infty$. Έστω $A = (f : \hat{a}, \hat{a})$ ο πίνακας αναπαράστασης της f ως προς μια διατεταγμένη βάση $\hat{a}$ του V και λ μια ιδιοτιμή του A , τότε,

$$\dim(V(\lambda)) = n - \text{rank}(A - \lambda I_{n \times n}).$$

Λύση Ξέρουμε από Θεώρημα ότι

$$n = \dim \text{Ker}(f - \lambda I_{n \times n}) + \dim \text{Im}(f - \lambda I_{n \times n}).$$

Αλλά $\text{Ker}(f - \lambda I_{n \times n}) = V(\lambda)$. Επομένως,

$$\begin{aligned} \dim(V(\lambda)) &= n - \dim \text{Im}(f - \lambda I_{n \times n}) \\ &= n - \dim(\text{χώρου στηλών του } A - \lambda I_{n \times n}) \\ &= n - \text{rank}(A - \lambda I_{n \times n}). \end{aligned}$$

Άσκηση 14 Να βρεθεί η διάσταση του (μοναδικού) ιδιοχώρου του πίνακα

$$A := \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & a & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}.$$

Λύση Ο πίνακας A είναι άνω τριγωνικός, επομένως

$$\chi_A(t) = (-1)^n(t-1)^n,$$

δηλ. η (μοναδική) ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = 1$ η οποία έχει αλγεβρική πολλαπλότητα n . Από την προηγούμενη άσκηση έχουμε ότι $\dim_{\mathbb{F}} V(1) = n - \text{rank}(A - I_{n \times n})$. Αλλά,

$$A - I_{n \times n} = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Έτσι, αν $a = 0$, τότε, $\text{rank}(A - I_{n \times n}) = 0 \Rightarrow \dim_{\mathbb{F}} V(1) = n$ ενώ αν $a \neq 0$, τότε, $\text{rank}(A - I_{n \times n}) = n - 1 \Rightarrow \dim_{\mathbb{F}} V(1) = 1$.

Άσκηση 15 Να βρεθεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα $a, b, c \in \mathbb{R}$ έτσι ώστε ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ a & 3 & 0 \\ b & c & -2 \end{bmatrix}$$

να διαγωνοποιείται.

Λύση Έχουμε ότι $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 2)$. Για να διαγωνοποιείται ο A , αρκεί από Θέωρημα οι διαστάσεις των δύο ιδιοχώρων $V(3), V(-2)$ έχουν άθροισμα $= 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. Θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση

$$\dim(V(\lambda)) = n - \text{rank}(A - \lambda I_{n \times n})$$

από την προηγούμενη άσκηση. Έχουμε

$$A - 3I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -5 \end{bmatrix}.$$

Επομένως, αν $a = 0$, $b, c \in \mathbb{R}$, τότε $\text{rank}(A - 3I_{3 \times 3}) = 1$ ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, $\text{rank}(A - 3I_{3 \times 3}) = 2$. Επίσης,

$$A + 2I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ a & 5 & 0 \\ b & c & 0 \end{bmatrix}.$$

Συνεπώς, $\text{rank}(A + 2I_{3 \times 3}) = 2$. έτσι, ο πίνακας διαγωνοποιείται αν $a = 0$, $b, c \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 16 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Απλοποιείστε τον πίνακα $A^5 - 2A^4 + 3I_{3 \times 3}$.

Λύση Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A είναι

$$\chi_A(t) = -t^3 + 2t^2 + t - 2.$$

Από το Θεώρημα Cayley - Hamilton έχουμε ότι $x_A(A) = 0_{2 \times 2}$, δηλ.

$$-A^3 + 2A^2 + A - 2I_{2 \times 2} = 0. \quad (10)$$

Επίσης, από τον Αλγόριθμο της Διαίρεσης πολυωνύμων έχουμε ότι

$$(t^5 - 2t^4 + 3)/\chi_A(t) = t^2 + 1 + \frac{t+1}{\chi_A(t)},$$

δηλ.

$$t^5 - 2t^4 + 3 = \chi_A(t)(t^2 + 1) + t + 1. \quad (11)$$

Έτσι, από τις (10), (11) έπεται ότι

$$A^5 - 2A^4 + 3I_{3 \times 3} = \chi_A(A)(A^2 + I_{3 \times 3}) + A + I_{3 \times 3} = A + I_{3 \times 3}.$$

Άσκηση 17 Έστω $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ με $x_A(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$, $b \neq 0$. Υπολογίστε τους A^3 και A^{-1} .

Λύση Καταρχήν ο A είναι αντιστρέψιμος, αφού $\det A = b \neq 0$. Από το Θεώρημα Cayley - Hamilton έχουμε ότι $x_A(A) = 0_{2 \times 2}$. Δηλ.

$$x_A(A) = A^2 + aA + bI_{2 \times 2} = 0_{2 \times 2} \Leftrightarrow A^2 = -aA - bI_{2 \times 2}$$

και

$$\begin{aligned} A^3 &= AA^2 = A(-aA - bI_{2 \times 2}) = -aA^2 - bA = -a(-aA - bI_{2 \times 2}) - bA \\ &= (a^2 - b)A + abI_{2 \times 2}. \end{aligned}$$

Επίσης,

$$A^2 + aA + bI_{2 \times 2} = 0_{2 \times 2} \Rightarrow A(a + aI_{2 \times 2}) = -bI_{2 \times 2} \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{b}A - \frac{a}{b}I_{2 \times 2}$$

Άσκηση 18 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ένας αντιστρέψιμος πίνακας. Εκφράστε τον A^{-1} ως γραμμικό συνδυασμό δυνάμεων του A τάξης το πολύ $n - 1$.

Λύση Έστω

$$\chi_A(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0$$

το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A . Από το Θεώρημα Cayley-Hamilton έχουμε ότι $\chi_A(A) = 0$, δηλ.

$$0 = \chi_A(A) = (-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_0 I_{n \times n}.$$

Αλλά $a_0 = \det(A) I_{n \times n}$. Έτσι,

$$(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + \det(A) I_{n \times n} = 0.$$

Έτσι, η πιο πάνω σχέση γράφεται ως

$$-\det(A) I_{n \times n} = A[(-1)^n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + c_1 I_{n \times n}].$$

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της πιο πάνω σχέσης με A^{-1} έχουμε

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{-1}{\det(A)} (A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1 I_{n \times n}) \\ a_{n-1} &\stackrel{=}{=} (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) \frac{-1}{\det(A)} (A^{n-1} + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) A^{n-2} + \dots + a_1 I_{n \times n}) \end{aligned}$$

Άσκηση 19 Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Υπολογίστε τον A^{-1} .

Λύση Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A είναι

$$\chi_A(t) = t^3 - 4t^2 - 3t + 10.$$

Από το Θεώρημα Cayley - Hamilton έχουμε ότι $x_A(A) = 0_{3 \times 3}$, δηλ.

$$\begin{aligned} & A^3 - 4A^2 - 3A + 10I_{3 \times 3} = 0_{3 \times 3} \\ \Rightarrow & -A^3 + 4A^2 + 3A = 10I_{3 \times 3} \\ \Rightarrow & -\frac{1}{10}(A^3 - 4A^2 - 3A) = I_{3 \times 3} \\ \stackrel{A^{-1}}{\Rightarrow} & A^{-1} = -\frac{1}{10}(A^2 - 4A - 3I_{3 \times 3}) \\ & = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Άσκηση 20 Έστω $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^4 = 0_{3 \times 3}$. Ισχύει ότι $A^3 = 0_{3 \times 3}$; Αν όμως $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^3 = 0_{3 \times 3}$, ισχύει ότι $A^2 = 0_{3 \times 3}$;

Λύση Έστω $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^4 = 0_{3 \times 3}$ και έστω $\lambda \in \mathbb{R}$ μια ιδιοτιμή του A , τότε $\lambda^4 = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \chi_A(t) = t^3 \Rightarrow A^3 = 0_{3 \times 3}$, όπου η τελευταία ισότητα έπεται από το Θεώρημα Cayley-Hamilton. Αν $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ τέτοιος ώστε $A^3 = 0_{3 \times 3}$, τότε δεν ισχύει εν γένει ότι ισχύει ότι $A^2 = 0_{3 \times 3}$. Για παράδειγμα, αν

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

τότε $A \neq A^2 \neq A^3$.

Άσκηση 21 Έστω $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ με μόνη ιδιοτιμή τη $\lambda = 0$. Δείξτε ότι $A^n = 0_{n \times n}$.

Λύση Αφού η $\lambda = 0$ είναι η μόνη ιδιοτιμή του A , έπεται ότι $\chi_A(t) = t^n$ και άρα από το Θεώρημα Cayley-Hamilton έπεται ότι $\chi_A(A) = 0_{n \times n}$, δηλ. $A^n = 0_{n \times n}$.

Άσκηση 22 Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ με $A^m = 0_{n \times n}$ για κάποιο $m \in \mathbb{Z}_+$, δηλ. ο A είναι μηδενοδύναμος. Δείξτε ότι ο A διαγωνοποιείται αν και μόνο αν $A = 0_{n \times n}$.

Λύση ($\Rightarrow$) Έστω ότι ο A είναι διαγωνοποιήσιμος. Τότε το ελάχιστο του πολυώνυμο $m_A(t)$ είναι γινόμενο πρωτοβαθμίων παραγόντων. Θεωρούμε το πολυώνυμο $p(t) = t^m$. Τότε, από υπόθεση, $p(A) = A^m = 0_{n \times n}$. Επομένως, $m_A(t)/p(t) \Rightarrow m_A(t) = t^k$, $1 \leq k \leq m$. Αλλά το $m_A(t)$ είναι γινόμενο πρωτοβαθμίων παραγόντων, συνεπώς $m_A(t) = t$ και άρα από το Θεώρημα Cayley-Hamilton έπεται ότι $m_A(A) = 0_{n \times n}$.

($\Leftarrow$) Αν $A = 0_{n \times n}$ τότε A διαγωνοποιήσιμος.

Άσκηση 23 Βρείτε ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού που να έχει ρίζα τον πίνακα

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Λύση Από το Θεώρημα Cayley - Hamilton γνωρίζουμε ότι ένας πίνακας μηδενίζει το χαρακτηριστικό του πολυώνυμο. Άρα αρκεί να βρούμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα. Έχουμε

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -4 & 3 \\ 0 & t-3 & -1 \\ 0 & -2 & t+1 \end{vmatrix} = (t-1)(t^2-2t-5) = t^3-3t^2-3t+5$$

είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα και άρα μηδενίζεται από αυτόν.

Άσκηση 24 Βρείτε τον A^5 , όπου

$$A := \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Λύση Αφού ο A είναι άνω τριγωνικός, οι ιδιοτιμές του είναι τα στοιχεία της διαγωνίου. Άρα, $\chi_A(t) = (-1)^3(t+1)(t-1)(t-2) = -t^3+2t^2+t-2$. Από το Θεώρημα Cayley - Hamilton, θα είναι $x(A) = 0$, δηλ.

$$\begin{aligned} \chi_A(A) &= -A^3 + 2A^2 + A - 2I_{2 \times 2} = 0 \Leftrightarrow A^3 = 2A^2 + A - 2I_{2 \times 2} \\ \stackrel{A}{\Leftrightarrow} A^4 &= 2A^3 + A^2 - 2A = 2(2A^2 + A - 2I_{2 \times 2}) + A^2 - 2A = 5A^2 - 4I_{2 \times 2} \\ \Leftrightarrow A^5 &= 5A^3 - 4A = 5(2A^2 + A - 2I_{2 \times 2}) - 4A = 10A^2 + A - 10I_{2 \times 2}. \end{aligned}$$

Άσκηση 25 Να βρεθούν τα χαρακτηριστικά πολυώνυμα των πινάκων

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

και να εξεταστεί αν αυτοί είναι όμοιοι.

Λύση Έχουμε ότι (αφού A άνω τριγωνικός)

$$\chi_A(t) = (-1)^3(t-3)^3 = -(t-3)^3.$$

Συνεπώς, $m_A(t) = t-3$ ή $(t-3)^2$ ή $(t-3)^3$. Αλλά,

$$A - 3I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0_{3 \times 3}, \quad (A - 3I_{3 \times 3})^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0_{3 \times 3}$$

αλλά $(A - I_{3 \times 3})^3 = 0_{3 \times 3}$, επομένως, $m_A(t) = (t-3)^3 = \chi_A(t)$. Για τον πίνακα B , έχουμε ότι

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & & 0 \\ & B_2 & \\ 0 & & B_3 \end{bmatrix},$$

όπου $B_i = (3) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$, $i = 1, 2, 3$ με $m_{B_i}(t) = t-3$. Τότε, από Θεώρημα,

$$m_B(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{B_1}(t), m_{B_2}(t), m_{B_3}(t)) = t-3.$$

Επομένως, $m_B(t) \neq m_A(t)$, άρα A, B όχι όμοιοι.

Άσκηση 26 Δείξτε ότι όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο ελάχιστο πολυώνυμο. Ισχύει το αντίστροφο;

Λύση 1ος Τρόπος

Έστω $A, B \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$ δύο όμοιοι πίνακες. Τότε, υπάρχει $f \in \text{End}(\mathbb{F}^{m \times 1})$ και διατεταγμένες βάσεις $\hat{a}$ και $\hat{b}$ του $\mathbb{F}^{m \times 1}$ τέτοιες ώστε $(f : \hat{a}, \hat{a}) = A$ και $(f : \hat{b}, \hat{b}) = B$. Τότε, $m_f(t) = m_A(t)$ και $m_f(t) = m_B(t)$. Άρα, $m_A(t) = m_B(t)$.

2ος Τρόπος

Έστω $A, B \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$ δύο όμοιοι πίνακες. Τότε υπάρχει $F \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$ αντιστρέψιμος τέτοιος ώστε $S^{-1}AS = B$. Τότε, αν

$$p(t) = a_0 I_{m \times m} + a_1 t + \dots + a_k t^k \in \mathbb{F}_k[t],$$

τότε,

$$\begin{aligned} p(B) &= a_0 I_{m \times m} + a_1 B + \dots + a_k B^k \\ &= a_0 I_{m \times m} + a_1 S^{-1}AS + \dots + a_k (S^{-1}AS)^k \\ &= a_0 S^{-1}I_{m \times m}S + a_1 S^{-1}AS + \dots + a_k S^{-1}A^k S \\ &= S^{-1}(a_0 I_{m \times m} + a_1 A + \dots + a_k A^k) \\ &= S^{-1}p(A)S. \end{aligned}$$

Συνεπώς, $p(B) = 0 \Leftrightarrow p(A) = 0$, άρα $m_A(x) = m_B(x)$.

Το αντίστροφο δεν ισχύει, π.χ. αν

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

τότε, $m_A(t) = m_B(t) = t^2$, αλλά οι δύο πίνακες δεν είναι όμοιοι αφού $\text{rank}(A) = 1 \neq \text{rank}(B) = 2$.

Αλλά, αν $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ με $m_A(t) = m_B(t)$ και $\chi_A(t) = \chi_B(t)$ και καμιά ιδιοτιμή δεν έχει αλγεβρική πολλαπλότητα μεγαλύτερη από 3, τότε οι πίνακες A, B είναι όμοιοι. Επίσης ισχύει ότι αν $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ μηδενοδύναμοι, τότε A όμοιος με το B αν και μόνο αν $m_A(t) = m_B(t)$.

Άσκηση 27 Έστω $f : V \rightarrow V$ μια γραμμική απεικόνιση τέτοια ώστε $f^3 = 9f$. Δείξτε ότι η f είναι διαγωνοποιήσιμη.

Λύση Έστω $m_f(t)$ το ελάχιστο πολυώνυμο της f . Από υπόθεση έχουμε ότι $f^3 = 9f \Rightarrow f^3 - 9f = 0 \Rightarrow f \circ (f^2 - 9id_V) = 0$. Συνεπώς, $m_f(t) \mid [t(t^2 - 9) = t(t-3)(t+3)]$. Συνεπώς, το m_f θα είναι είτε το t , είτε το $t(t-3)$ είτε το $t(t+3)$ είτε το $t(t-3)(t+3)$, είτε το $(t-3)(t+3)$ είτε το $t-3$ είτε το $t+3$. Σε κάθε περίπτωση, το m_f είναι γινόμενο ανάγωγων πρωτοβαθμίων όρων, άρα η f διαγωνοποιείται.

Άσκηση 28 Έστω $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ με

$$f(x, y, z) = (7x - y - 2z, -x + 7y + 2z, -2x + 2y + 10z).$$

Να εξεταστεί αν η f είναι διαγωνοποιήσιμη.

Λύση Θεωρούμε τη συνήθη βάση $\hat{e}$ του $\mathbb{R}^3$. Τότε,

$$(f : \hat{e}, \hat{e}) \equiv \mathcal{M}_{\hat{e}}^{\hat{e}} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 \\ -1 & 7 & 2 \\ -2 & 2 & 10 \end{bmatrix} := A.$$

Έχουμε ότι $\chi_A(t) = -(t-6)^2(t-12)$. Παρατηρούμε ότι $(A - 6I_{3 \times 3})(A - 12I_{3 \times 3}) = 0$, επομένως, $m_f(t) = (t-6)(t-12)$. Αφού λοιπόν το $m_f(t)$ είναι γινόμενο διακεκριμένων πρωτοβαθμίων παραγόντων, η f είναι διαγωνοποιήσιμη και ο A όμοιος προς τον πίνακα

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 29 Να δείχθει ότι αν $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, τότε $m_A(t) = m_{A^T}(t)$.

Λύση Έστω ότι

$$m_A(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{n-1} t^{n-1} + t^n.$$

Τότε,

$$\begin{aligned} m_A(A) &= a_0 I_{n \times n} + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1} + A^n \\ \Rightarrow (a_0 I_{n \times n} + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1} + A^n)^T &= 0_{n \times n} \\ \Rightarrow a_0 I_{n \times n} + a_1 A^T + \dots + (A^T)^n &= 0_{n \times n}, \end{aligned}$$

δηλ. $m_A(A^T) = 0$. Άρα, $m_{A^T}(t)/m_A(t)$. Ομοίως, δείχνουμε ότι $m_A(x)/m_{A^T}(t)$. Συνεπώς, $m_{A^T}(t) = cm_A(t)$. Αλλά τα δύο αυτά πολυώνυμα είναι μονικά, άρα τελικά είναι ίσα.

Άσκηση 30 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$ και τέτοιος ώστε $V = V_1 \oplus V_2$, όπου V_1, V_2 f -αναλλοίωτοι υπόχωροι του V . Δείξτε ότι

$$m_f(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{f|_{V_1}}(t), m_{f|_{V_2}}(t)).$$

Λύση Από Πρόταση έχουμε ότι

$$\chi_{f_{V_1}}(t), \chi_{f_{V_2}}(t) / \chi_f(t), \quad m_{f_{V_1}}(t), m_{f_{V_2}}(t) / m_f(t).$$

Συνεπώς, το $m_f(t)$ είναι κοινό πολλαπλάσιο των $m_{f_{V_1}}(t)$, $m_{f_{V_2}}(t)$. Θα δείξουμε ότι είναι και το ελάχιστο. Έστω $\phi(t)$ ένα άλλο κοινό πολλαπλάσιο των $m_{f_{V_1}}(t)$, $m_{f_{V_2}}(t)$. Τότε, αν $v \in V = V_1 \oplus V_2$, είναι $v = v_1 + v_2$, όπου $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. Έτσι

$$\phi(f)(v) = \phi(f)(v_1) + \phi(f)(v_2) = \phi(f|_{V_1})(v_1) + \phi(f|_{V_2})(v_2) = 0.$$

Επομένως, $\phi(f) = 0$, άρα $m_f(t) / \phi(t)$. Συνεπώς,

$$m_f(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{f|_{V_1}}(t), m_{f|_{V_2}}(t)).$$

0.0.1 Παράρτημα

εδώ θα δούμε μερικές χρήσιμες στις Διαφορικές Εξισώσεις Ιδιότητες του Θεωρήματος Cayley-Hamilton.

Προσδιορισμός Αναλυτικών Συναρτήσεων Πινάκων Έστω $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, όπου $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ χωρίο. Τότε, η f γράφεται ως δυναμοσειρά έστω χωρίς απώλεια της γενικότητας με κέντρο το 0 και ακτίνας $R < \text{dist}(0, \partial\Omega)$, δηλ.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, \quad |z| < R.$$

Έστω $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $\chi_A(z)$ και ιδιοτιμές λ_i . Τότε, από τον Ευκλείδειο Αλγόριθμο της Διαίρεσης, έχουμε

$$f(z) = q(z)\chi_A(z) + r(z),$$

όπου το r είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ $n - 1$. Τότε, για $z = \lambda_i$, έχουμε:

$$f(\lambda_i) = r(\lambda_i) = \sum_{k=0}^{n-1} d_k \lambda_i^k.$$

Το σύστημα αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τους συντελεστές d_k , $1 \leq k \leq n - 1$. Τώρα,

$$f(A) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k z^k = \chi_A(A) \sum_{n=0}^{\infty} d_k z^k + r(A) = r(A),$$

με την τελευταία ισότητα από το Θεώρημα Cayley-Hamilton. Έτσι,

$$f(A) = \sum_{k=0}^{n-1} d_k A^k.$$

Παράδειγμα Έστω

$$A := \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Θα προσδιορίσουμε την $\sin(A)$.

Η συνάρτηση $z \mapsto \sin(z)$ είναι ολόμορφη παντού στο επίπεδο και έχει ανάπτυγμα (με κέντρο το 0 και όσο μεγάλη ακτίνα σύγκλισης επιθυμούμε) το

$$\sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \quad (z \in \mathbb{C}).$$

Βρίσκουμε πολύ εύκολα ότι

$$\chi_A(z) = (z+2)(z+3).$$

Έτσι, οι ιδιοτιμές του A είναι οι $\lambda_1 = -3$ και $\lambda_2 = -2$. Αφού εδώ το $n = 2$, ο αλγόριθμος διαίρεσης μας δίνει ότι

$$\sin(z) = q(z)\chi_A(z) + r(z)$$

με το βαθμό του $r(z)$ να είναι το πολύ 1. Έστω λοιπόν ότι $r(z) = d_0 + d_1 z$. Τότε,

$$\begin{aligned} \sin(\lambda_1) &= \sin(-3) = d_0 + d_1 \lambda_1 = d_0 - 3d_1 \\ \sin(\lambda_2) &= \sin(-2) = d_0 + d_1 \lambda_2 = d_0 - 2d_1. \end{aligned}$$

Αυτό μας δίνει

$$\begin{aligned} d_0 &= 3 \sin(-2) - 2 \sin(-3) \\ d_1 &= \sin(-2) - \sin(-3). \end{aligned}$$

Τελικά,

$$\sin(A) = (3 \sin(-2) - 2 \sin(-3))I_{2 \times 2} + (\sin(-2) - \sin(-3))A,$$

δηλ.

$$\sin \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(-3) & \sin(-2) - \sin(-3) \\ 0 & \sin(-2) \end{bmatrix}.$$

Υπολογισμός Εκθετικών Δυνάμεων πίνακα Η συνάρτηση $z \mapsto e^z$ είναι ολόμορφη σε όλο το επίπεδο και έχει ανάπτυγμα (με κέντρο το 0 και όσο μεγάλη ακτίνα σύγκλισης επιθυμούμε) το

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Αν $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, επιθυμούμε να υπολογίσουμε παραστάσεις της μορφής

$$e^{At} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}. \quad (12)$$

Ακολουθώντας τη διαδικασία του πιο πάνω παραδείγματος, καταλήγουμε στον υπολογισμό της παράστασης

$$e^z = \sum_{k=0}^{n-1} d_k A^k \quad (13)$$

με τους συντελεστές d_k , $0 \leq k \leq n-1$ να υπολογίζονται με τη βοήθεια του Θεωρήματος Cayley-Hamilton μέσω της σχέσης

$$e^{\lambda_i t} = \sum_{k=1}^{n-1} d_k \lambda_i^k, \quad (14)$$

όπου λ_i οι ιδιοτιμές του A . αν κάποιες από τις ιδιοτιμές επαναλαμβάνονται, τότε η σχέση (14) θα εμπεριέχει δύο ή περισσότερες ίδιες εξισώσεις και άρα δεν θα αποτελεί γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο λύσεων. Επίσης, αν μια ιδιοτιμή παρουσιάζεται με πολλαπλότητα m , τότε τα πρώτα $m-1$ διαφορικά του $\chi_A(z)$ θα μηδενίζονται στις ιδιοτιμές και άρα οι εξισώσεις

$$\begin{aligned} f(\lambda_i) &= \sum_{k=0}^{n-1} d_k \lambda_i^k = r(\lambda_i) \\ \frac{df}{d\lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_i} &= \frac{dr}{d\lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_i} \\ &\vdots \\ \frac{d^{m-1}f}{d\lambda^{m-1}} \Big|_{\lambda=\lambda_i} &= \frac{d^{m-1}r}{d\lambda^{m-1}} \Big|_{\lambda=\lambda_i}. \end{aligned}$$

αποτελούν ένα σύστημα m το πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων εξισώσεων οι οποίες σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εξισώσεις θα μας δώσουν ένα σύστημα n εξισώσεων από τις οποίες προσδιορίζουμε τους συντελεστές d_k , $1 \leq k \leq n$.

Παραδείγματα

1. Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Θα προσδιορίσουμε τον e^{At} . Έχουμε ότι $\chi_A(z) = (z+1)(z+2)$. Από την εξίσωση (13) έχουμε ότι $e^{At} = d_0 I_{2 \times 2} + d_1 A$. Από τις εξισώσεις (14) έχουμε

$$\begin{aligned} e^{-t} &= d_0 - d_1 \\ e^{-2t} &= d_0 - 2d_1 \end{aligned}$$

Έτσι, $d_0 = (2e^{-t} - e^{-2t})$ και $d_1 = (e^{-t} - e^{-2t})$. Άρα,

$$e^{At} = (2e^{-t} - e^{-2t})I_{2 \times 2} + (e^{-t} - e^{-2t})A = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

2. Έστω ο πίνακας

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Θα προσδιορίσουμε τον e^{At} . Έχουμε ότι $\chi_A(z) = z^2 + 1 = (z-i)(z+i)$. Από την εξίσωση (13) έχουμε ότι $e^{At} = d_0 I_{2 \times 2} + d_1 A$. Από τις εξισώσεις (14) έχουμε

$$\begin{aligned} e^{it} &= d_0 + id_1 = \cos t + i \sin t \\ e^{-it} &= d_0 - id_1 = \cos t - i \sin t \end{aligned}$$

δηλ. $d_0 = \cos t$ και $d_1 = \sin t$. Άρα,

$$e^{At} = \cos t I_{2 \times 2} + \sin t A = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

Γραμμική Άλγεβρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ VI - Θέωρημα Πρωταρχικής Ανάλυσης, Ανάλυση κατά Jordan

Θεώρημα 0.0.4 [Πρωταρχικής Ανάλυσης] Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f \in \text{End}(V)$ με

$$m_f(t) = p_1(t)^{n_1} p_2(t)^{n_2} \dots p_k(t)^{n_k},$$

όπου $p_1, p_2, \dots, p_k$ διακεκριμένα ανάγωγα πολυώνυμα του $\mathbb{F}[x]$. Τότε, κάθε $V_i = \ker(p_i(f)^{n_i})$ είναι ένας f -αναλλοίωτος υπόχωρος του V και ισχύει

$$V = \bigoplus_{i=1}^n V_i.$$

Επιπλέον,

$$m_{f|_{V_i}}(t) = p_i(t)^{n_i}, \quad i \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Πόρισμα 0.0.5 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος επί του $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Έστω $f \in \text{End}(V)$ με

$$\chi_f(t) = (-1)^m p_1(t)^{\tau_1} p_2(t)^{\tau_2} \dots p_k(t)^{\tau_k}$$

και

$$m_f(t) = p_1(t)^{n_1} p_2(t)^{n_2} \dots p_k(t)^{n_k},$$

όπου $p_1, p_2, \dots, p_k$ διακεκριμένα ανάγωγα πολυώνυμα του $\mathbb{F}[x]$ με πρώτο συντελεστή 1. Αν B_i είναι μια διατεταγμένη βάση του $\ker(p_i(f)^{n_i})$, $1 \leq i \leq k$, τότε η $\hat{B} = (B_1, \dots, B_k)$ είναι μια διατεταγμένη βάση του V και

$$\mathcal{M}_{\hat{B}}^{\hat{B}} \equiv (f : \hat{B}, \hat{B}) = \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_k \end{bmatrix}.$$

Επιπλέον,

$$\chi_{A_i}(t) = (-1)^{\tau_i \deg(p_i(t))} p_i(t)^{\tau_i} \quad \text{και} \quad m_{A_i}(t) = p_i(t)^{n_i}.$$

Άσκηση 34 Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Να δείχθει ότι ο A είναι όμοιος προς έναν πίνακα της μορφής

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Λύση Έχουμε ότι $\chi_A(t) = (t^2 + 1)(t - 2)$ και (άρα) $m_A(x) = (t^2 + 1)(t - 2)$. Συνεπώς, αφού το ελάχιστο πολυώνυμο δεν είναι γινόμενο ανάγωγων πολυωνύμων, ο A δεν είναι διαγωνοποιήσιμος. Θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα Πρωταρχικής Ανάλυσης για να βρούμε έναν πίνακα απλούστερης μορφής διαγώνιο προς τον A . Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\gamma_A : \mathbb{R}^{3 \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad \text{με} \quad X \mapsto \gamma_A(X) := AX.$$

Από το Θεώρημα (0.0.4), έχουμε ότι

$$\mathbb{R}^{3 \times 1} = \ker(\gamma_A^2 + id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}}) \oplus \ker(\gamma_A - 2id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}}).$$

Θα βρούμε βάσεις για τους $\ker(\gamma_A^2 + id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}})$ και $\ker(\gamma_A - 2id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}})$. Έχουμε ότι

$$\gamma_A^2 + id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}} = \gamma_A^2 + \gamma_{I_{3 \times 3}} = \gamma_{A^2 + I_{3 \times 3}}$$

και αφού

$$A^2 + I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -10 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

έπεται ότι

$$\ker(\gamma_A^2 + id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}}) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid (A^2 + I_{3 \times 3})X = 0_{3 \times 3}\} = \text{span}\{(1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}.$$

Επίσης,

$$\gamma_A - 2id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}} = \gamma_A - 2\gamma_{I_{3 \times 3}} = \gamma_{A - 2I_{3 \times 3}}$$

και αφού

$$A - 2I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -10 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

έπεται ότι

$$\ker(\gamma_A - 2id_{\mathbb{R}^{3 \times 1}}) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid (A - 2I_{3 \times 3})X = 0_{3 \times 3}\} = \text{span}\{(1, 0, 2)^T\}.$$

Θεωρούμε λοιπόν ως βάση

$$\hat{b} := ((1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T, (1, 0, 2)^T).$$

Υπολογίζουμε τις εικόνες των 3 αυτών διανυσμάτων της $\hat{b}$ μέσω της γ_A :

$$\begin{aligned} \gamma_A((1, 1, 0)^T) &= A(1, 1, 0)^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \gamma_A((0, 0, 1)^T) &= A(0, 0, 1)^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \gamma_A((1, 0, 2)^T) &= A(1, 0, 2)^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$M_{\hat{b}}^{\hat{b}}(\gamma_A) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -0 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ο A είναι όμοιος προς τον πίνακα αυτό.

Γραμμική Άλγεβρα

Ασκήσεις VI- Διαγωνοποίηση με τη μέθοδο Jordan

Θεώρημα 0.0.5 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Αν

$$\chi_f(t) = (t - \lambda)^m \quad \text{και} \quad m_f(t) = (t - \lambda)^n,$$

τότε υπάρχει μια διατεταγμένη βάση $\widehat{b}$ του V τέτοια ώστε

$$(f : \widehat{b}, \widehat{b}) = \begin{bmatrix} J_{\lambda, \delta_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\lambda, \delta_\tau} \end{bmatrix}$$

όπου

1. $\tau = \dim_{\mathbb{F}} V(\lambda)$
2. $\chi_f(t) = \chi_{J_{\lambda, \delta_1}}(t) \dots \chi_{J_{\lambda, \delta_\tau}}(t) = (t - \lambda)^m$ και άρα

$$m = \sum_{i=1}^{\tau} \delta_i.$$

3. $m_f(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_{\lambda, \delta_1}}(t) \dots m_{J_{\lambda, \delta_\tau}}(t)) = (t - \lambda)^n$ και άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον $i \in \{1, 2, \dots, \tau\}$ τέτοιο ώστε $\delta_i = n$.

Πόρισμα 0.0.6 Έστω $f \in \text{End}(V)$, όπου V διανυσματικός χώρος επί ενός σώματος $\mathbb{F}$ με $\dim_{\mathbb{F}}(V) < \infty$. Αν

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} (t - \lambda_2)^{n_2} \dots (t - \lambda_k)^{n_k},$$

όπου $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές της f , τότε υπάρχει μια διατεταγμένη βάση $\widehat{b}$ του V τέτοια ώστε

$$(f : \widehat{b}, \widehat{b}) = \begin{bmatrix} J_{\lambda_1, \delta_{(1, \lambda_1)}} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_{\lambda_1, \delta_{(\tau_{\lambda_1}, \lambda_1)}} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & J_{\lambda_k, \delta_{(1, \lambda_k)}} & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & J_{\lambda_k, \delta_{(\tau_{\lambda_k}, \lambda_k)}} \end{bmatrix}$$

Πρόταση 0.0.9 Έστω V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης και έστω $f \in \text{End}(V)$ η οποία είναι μηδενοδύναμη δείκτη $k \in \mathbb{N}$. Τότε, ισχύει ότι

$$\{0_V\} \subsetneq \ker f \subsetneq \ker f^2 \subsetneq \dots \subsetneq \ker f^{k-1} \subsetneq \ker f^k = V.$$

Άσκηση 35 Έστω $f \in \text{End}(\mathbb{R}^4)$ με $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (0, x_1, x_4, 0)$. Να βρεθεί μια βάση του $\mathbb{R}^4$ ως προς την οποία ο πίνακας της f να είναι της μορφής:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Λύση Έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (0, x_1, x_4, 0) \\ \Rightarrow f(f(x_1, x_2, x_3, x_4)) &= f((0, x_1, x_4, 0)) = (0, 0, 0, 0), \end{aligned}$$

δηλ. $f^2 = 0$, δηλ. f μηδενοδύναμη βαθμού 2. Θεωρούμε λοιπόν τους χώρους

$$\begin{aligned} W_1 &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid f((x_1, x_2, x_3, x_4)) = (0, 0, 0, 0)\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid (0, x_1, x_4, 0) = (0, 0, 0, 0)\} \\ &= \text{span}\{(0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 0)^T\} = \{e_2, e_3\}. \end{aligned}$$

και $W_2 = \ker f^2$. Αφού $f^2 = 0$, έπεται ότι $W_2 = \mathbb{R}^4$. Θεωρούμε τη βάση

$$\mathcal{B}_1 = \{(0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 0)^T\}$$

του W_1 και την επεκτείνουμε σε μια βάση $\mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_3$ του W_2 . Για παράδειγμα, το $\mathcal{B}_3$ μπορεί να είναι το σύνολο $\{(1, 0, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T\} = \{e_1, e_4\}$. Το σύνολο $f(\mathcal{B}_3) = \{f(1, 0, 0, 0)^T, f(0, 0, 0, 1)^T\} = \{(0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 0)^T\}$ είναι ένα γραμμικά ανεξάρτητο υποσύνολο του W_1 . Τέλος, θεωρούμε τη διατεταγμένη βάση

$$\hat{a} := (f(1, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), f(0, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 1)) \equiv (u_1, u_2, u_3, u_4).$$

Οι εικόνες των στοιχείων αυτών μέσω της f είναι

$$\begin{aligned} f(u_1) &= f(f(1, 0, 0, 0)) = 0 \\ f(u_2) &= f(1, 0, 0, 0) = u_1 \\ f(u_3) &= f(f(0, 0, 0, 1)) = 0 \\ f(u_4) &= f(0, 0, 0, 1) = u_3. \end{aligned}$$

Έτσι,

$$(f : \hat{a}, \hat{a}) \equiv \mathcal{M}_{\hat{a}}^{\hat{a}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{0,2} & 0 \\ 0 & J_{0,2} \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 36 Έστω $A \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ με $\chi_A(t) = (t-2)^4(t-3)^5$ και $m_A(t) = (t-2)^3(t-3)^4$. Να βρεθούν όλες οι κανονικές μορφές Jordan του A .

Λύση Έστω

$$\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

η κανονική μορφή Jordan του A . Τότε, αφού

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t)) = (t-2)^3(t-3)^4,$$

έπεται ότι κάποιοι από τους J_i , $1 \leq i \leq \sigma$ είναι οι $J_{2,3}$, $J_{3,4}$. Αλλά $\chi_A(t) = \chi_{J_1}(t) \dots \chi_{J_\sigma}(t) = (t-2)^4(t-3)^5$, έπεται ότι $\sigma = 4$ και οι άλλοι 2 στοιχειώδεις πίνακες Jordan είναι οι $J_{2,1}$, $J_{3,1}$. Έτσι, η μοναδική κανονική μορφή Jordan του A είναι η

$$\begin{bmatrix} J_{2,3} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{3,4} & \\ & & & J_{3,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 2 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 2 & & & \\ & & & 2 & & \\ & & & & 3 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 3 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 & 3 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 3 \\ & & & & & & & 3 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 37 Έστω $A \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ με $\chi_A(t) = (t-2)^4(t-3)^5$ και $m_A(t) = (t-2)^3(t-3)^3$. Να βρεθούν όλες οι κανονικές μορφές Jordan του A .

Λύση Έστω

$$\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

η κανονική μορφή Jordan του A . Τότε, αφού

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t)) = (t-2)^3(t-3)^3,$$

έπεται ότι κάποιοι από τους J_i , $1 \leq i \leq \sigma$ είναι οι $J_{2,3}$, $J_{3,3}$. Αλλά $\chi_A(t) = \chi_{J_1}(t) \dots \chi_{J_\sigma}(t) = (t-2)^3(t-3)^5$, έπεται ότι ή $\sigma = 4$ με τους δύο άλλους στοιχειώδεις πίνακες Jordan να είναι οι $J_{2,1}$, $J_{3,2}$ ή $\sigma = 5$ με τους τρεις άλλους στοιχειώδεις πίνακες Jordan να είναι οι $J_{2,1}$, $J_{3,1}$, $J_{3,1}$. Έτσι, οι κανονικές μορφές Jordan του A είναι οι

$$\begin{bmatrix} J_{2,3} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{3,2} & \\ & & & J_{3,3} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{2,3} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{3,1} & \\ & & & J_{3,1} & \\ & & & & J_{3,3} \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 38 Έστω $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ με $\chi_A(t) = (t-6)^5$ και $m_A(t) = (t-6)^2$. Να βρεθούν όλες οι κανονικές μορφές Jordan του A .

Λύση Έστω

$$\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

η κανονική μορφή Jordan του A . Τότε, αφού

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t)) = (t-6)^5,$$

έπεται ότι κάποιος από τους J_i , $1 \leq i \leq \sigma$ είναι ο $J_{6,2}$. Αλλά $\chi_A(t) = \chi_{J_1}(t) \dots \chi_{J_\sigma}(t) = (t-6)^2$, έπεται ότι ή $\sigma = 3$ με τους δύο άλλους στοιχειώδεις πίνακες Jordan να είναι οι $J_{6,2}$, $J_{6,1}$ ή $\sigma = 4$ με τους τρεις άλλους στοιχειώδεις πίνακες Jordan να είναι οι $J_{6,1}$, $J_{6,1}$, $J_{6,1}$. Έτσι, οι κανονικές μορφές Jordan του A είναι οι

$$\begin{bmatrix} J_{6,2} & & \\ & J_{6,2} & \\ & & J_{6,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & & \\ 0 & 6 & & \\ & & 6 & 1 \\ & & 0 & 6 \\ & & & & 6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{6,2} & & \\ & J_{6,1} & \\ & & J_{6,1} & \\ & & & J_{6,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & & \\ 0 & 6 & & \\ & & 6 & \\ & & & 6 & \\ & & & & 6 \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 39 Βρείτε όλες τις δυνατές κανονικές μορφές Jordan ενός πίνακα $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ με $\chi_A(t) = (t-2)^3(t-5)^2$.

Λύση Έστω

$$\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

η κανονική μορφή Jordan του A . Το ελάχιστο πολυώνυμο του A δε μας δίνεται οπότεν θα παρούμε περιπτώσεις δεδομένου βέβαια ότι

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t))$$

και

$$\chi_A(t) = \chi_{J_1}(t) \dots \chi_{J_\sigma}(t) = (t-2)^3(t-5)^2 :$$

$\sigma = 2$ και

$$(t-2)^3, (t-5)^2 \rightarrow J_{2,3}, J_{5,2},$$

$\sigma = 3$ και

$$\begin{aligned} (t-2)^3, \quad t-5, \quad t-5 &\rightarrow J_{2,3}, J_{5,1}, J_{5,1} \\ (t-2)^2, \quad (t-5)^2, \quad t-5 &\rightarrow J_{2,2}, J_{2,1}, J_{5,2} \end{aligned}$$

$\sigma = 4$ και

$$\begin{aligned} (t-2)^2, \quad t-2, \quad t-5, \quad t-5 &\rightarrow J_{2,2}, J_{2,1}, J_{5,1}, J_{5,1} \\ t-2, \quad t-2, \quad t-2, \quad (t-5)^2 &\rightarrow J_{2,1}, J_{2,1}, J_{2,1}, J_{5,2} \end{aligned}$$

και $\sigma = 5$ με

$$t-2, \quad t-2, \quad t-5, \quad t-5, \quad t-5 \rightarrow J_{2,1}, J_{2,1}, J_{5,1}, J_{5,1}, J_{5,1}.$$

Επομένως, ο A είναι όμοιος προς έναν από τους πίνακες

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} J_{2,3} & & & \\ & J_{5,2} & & \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{2,3} & & & \\ & J_{5,1} & & \\ & & J_{5,1} & \\ & & & J_{5,1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{2,2} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{5,2} & \\ & & & J_{5,2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{2,2} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{5,1} & \\ & & & J_{5,1} \end{bmatrix}, \\ &\begin{bmatrix} J_{2,1} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{2,1} & \\ & & & J_{5,2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{2,1} & & & \\ & J_{2,1} & & \\ & & J_{5,1} & \\ & & & J_{5,1} \\ & & & & J_{5,1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Άσκηση 40 Να ταξινομηθούν όλοι οι πίνακες $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ τέτοιοι ώστε $A^3 = I_{3 \times 3}$.

Λύση $A^3 = I_{3 \times 3} \Leftrightarrow A^3 - I_{3 \times 3} = 0_{3 \times 3}$. Θεωρούμε το πολυώνυμο $p(t) = t^3 - 1$. Τότε, $p(A) = 0_{3 \times 3}$ και άρα $m_A(t)/p(t)$. Αλλά,

$$p(t) = t^3 - 1 = (t-1)(t^2 + t - 1) = (t-1)(t-z_1)(t-z_2),$$

όπου

$$z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{C}.$$

Αν

$$\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

η κανονική μορφή Jordan του A , τότε αφού

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t)) = (t-1)(t-z_1)(t-z_2),$$

έχουμε ότι $\sigma = 3$ με τις ακόλουθες περιπτώσεις (συνδυασμούς) για τα ελάχιστα πολυώνυμα των J_i , $1 \leq i \leq 3$:

$$\begin{aligned}
 t-1, \quad t-1, \quad t-1 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,1}, J_{1,1} \\
 t-1, \quad t-1, \quad t-z_1 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,1}, J_{z_1,1} \\
 t-1, \quad t-1, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,1}, J_{z_2,1} \\
 t-1, \quad t-z_1, \quad t-z_1 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,z_1}, J_{1,z_1} \\
 t-1, \quad t-z_1, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,z_1}, J_{1,z_2} \\
 t-1, \quad t-z_2, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{1,1}, J_{1,z_2}, J_{1,z_2} \\
 t-z_1, \quad t-z_1, \quad t-z_1 &\Rightarrow J_{z_1,1}, J_{z_1,1}, J_{z_1,1} \\
 t-z_1, \quad t-z_1, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{z_1,1}, J_{z_1,1}, J_{z_2,1} \\
 t-z_1, \quad t-z_2, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{z_1,1}, J_{z_2,1}, J_{z_2,1} \\
 t-z_2, \quad t-z_2, \quad t-z_2 &\Rightarrow J_{z_2,1}, J_{z_2,1}, J_{z_2,1}.
 \end{aligned}$$

Επομένως, ο A είναι όμοιος προς έναν από τους πίνακες

$$\begin{aligned}
 &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & z_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & z_1 & 0 \\ 0 & 0 & z_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & z_1 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}, \\
 &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & z_2 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ 0 & z_1 & 0 \\ 0 & 0 & z_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ 0 & z_1 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ 0 & z_2 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} z_2 & 0 & 0 \\ 0 & z_2 & 0 \\ 0 & 0 & z_2 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Άσκηση 41 Να ταξινομηθούν όλοι οι πίνακες $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ τέτοιου ώστε $A^3 = A^2$.

Λύση $A^3 = A^2 \Leftrightarrow A^3 - A^2 = 0_{3 \times 3}$. Θεωρούμε το πολυώνυμο $p(t) = t^3 - t^2 = t^2(t-1)$. Τότε, $p(A) = 0_{3 \times 3}$ και άρα $m_A(t)/p(t)$. Αφού $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$, έπεται ότι ο A είναι όμοιος προς έναν πίνακα της μορφής

$$\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix},$$

όπου J_i στοιχειώδεις πίνακες Jordan. Έτσι, αφού $m_A(t)/t^2(t-1)$ και

$$m_A(t) = \varepsilon.κ.π.(m_{J_1}(t), \dots, m_{J_\sigma}(t)),$$

έπεται ότι οι πιθανές περιπτώσεις για τα m_{J_i} είναι τα t^2 και $t-1$. Έτσι, είτε $J_i = (0) = J_{0,0}$, είτε

$J_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = J_{0,2}$ είτε $J_i = J_{1,0} = (1)$. Δηλ. ο A είναι όμοιος ως προς έναν από τους πίνακες

$$\begin{bmatrix} J_{0,0} & & \\ & J_{0,0} & \\ & & J_{0,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} J_{1,0} & & \\ & J_{1,0} & \\ & & J_{1,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} J_{1,0} & & \\ & J_{1,0} & \\ & & J_{0,0} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} J_{0,0} & & \\ & J_{0,0} & \\ & & J_{1,0} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
\begin{bmatrix} J_{0,2} & \\ & J_{0,0} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} J_{0,0} & \\ & J_{0,2} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$